

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1958

N° 584

THÈSE

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PAR

PHILIPPE, ERNEST TCHERDAKOFF

Né le 30 Avril 1927 à Paris 9^e

PRÉSENTÉE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT

LE

1958

A propos de 19 observations d'Hypertension

Gravidique Récidivante :

Un essai d'interprétation pathogénique

Président : Monsieur le Professeur
L. Pasteur VALLERY-RADOT

FACULTE DE MEDICINE DE PARIS

Année 1958

N°

T H È S E

pour le

DOCTORAT EN MEDICINE

(Diplôme d'Etat)

par

Philippe, Ernest TCHERDAKOFF

Né le 30 Avril 1927 à Paris 9ème.

Présentée et soutenue publiquement

le



PROPOS DE 19 OBSERVATIONS D'HYPERTENSION GRAVIDIQUE RECIDIVANTE:
UN ESSAI D'INTERPRETATION PATHOGENIQUE

Président: Monsieur le Professeur

L. Pasteur Valléry-Radot



Digitized by the Internet Archive
in 2026

*A Monsieur le Professeur Pasteur Valéry Hadjilov
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris
Membre de l'Académie de Médecine
Membre de l'Académie Française
Grand Officier de la Légion d'Honneur*

A Monsieur le Professeur Paul GILLET

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine de Paris

qui a inspiré ce travail

A mes Maîtres dans les Hôpitaux

Mr.

Juslin Beaudeau L.

Professeur de Clinique à la
Faculté de Médecine de Paris

M.

Milard-Fregin

De Sars à

Milard-Fregin

Lamotte C.

Demare A.

Desclat M.

Professeurs Agrégés à la Faculté
de Médecine de Paris

Mme. Bertrand Mercier F.

M.

Mme H.

Pequignot H.

Klotz H.P.

Reville A.

Azouar F.

Sigales F.

Asquier L.

Ryckwaert A.

Boussier J.

Willi J.

Médecins des Hôpitaux de Paris

M.

Milard-Fregin

De Sars à

Milard-Fregin

Chirurgiens des Hôpitaux de Paris

PROFESSEURS

MM. Bérard (H.), Bessy (P.), Billard (H.), Cadoux
 (F.), Chancel (E.), Chomay (C.), Chevalier (P.), Dene
 (R.), Douzellet (E.), Gassiot (P.), Guillaum (G.),
 Halphen (E.), Harvier (P.), Hazard (R.), Henner (G.),
 Lapeyre (C.), Landry (Ch.), Lepoint (F.), Levy Saint
 (E.), Lherique (I.), Lien (C.), Lecomte (M.), Marion (G.),
 Mathieu (P.), Mequert (P.), Monner (H.), Monod (R.),
 Molin (P.), Olivier (E.), Rignet (Ch.), Strchi (A.),
 Tassin (L.), Velter (E.),

DOYEN..... Léon BINET
 Membre de l'Institut
 ASSESSEUR..... Jean VERNE

PROFESSEURS

Anatomie	COCHET (J.)
Anatomie pathologique	DELLARDE (A.)
Anatomie histologique	MASSARD (J.)
Embryologie	PASTRELLI (G.)
Physiologie animale	JATTE (H.)
Biologie appliquée à l'industrie	
Physiologie et pathologie humaine	FRANLEY-BERT (P.)
Biologie végétale	PARROT (J.)
Physiologie médicale et Sociale	BENARD (J.)
Biologie expérimentale	MAIS (G.)
Clinique de cardiologie	MCQUINN (M.)
	SICARD (A.)
Chirurgie	QUENU (J.)
Chirurgie	MENEGAU (H.)
Chirurgie	MOULONGHET (F.)

Maladies infectieuses.....	BASTIN (R.)
Médecine légale.....	(DEROBERT (L.) pr.s.ch.)
Médecine du travail.....	(HAULTIER (M.)
Neuro-chirurgie.....	(HADENGUE (A.)
Neurologie.....	(ALEMARIY (C.)
	DAVID (M.)
	LHERMITTE (F.)
	(GRASSET (J.)
	(LELORIER (G.)
Obstétrique.....	(LEPAGE (F.)
	(MERGER (R.)
	(MORIN (P.)
	(RAVINA (J.)
	(ROBEY (M.)
Ophtalmologie.....	(BREGEAT (P.)
Orthopédie.....	(DESVIGNES (P.)
Oto-rhino-laryngologie.....	(JUDET (R.)
	(AUBRY (M.)
	(MAURO (R.)
Parasitologie.....	(BRUMPT (L. C.) pr.s.ch.
	(CHABAUD (A.)
Pathologie chirurgicale.....	(RUDLER (J.) pr.s.ch. (dét)
	(ABOULKER (P.)
	(BARCAT (J.)
	(CAUCHOIX (J.)
	(DUBOST (C.)
	(FAUREL (J.)
	(FLABEAU (F.)
	(GERMAIN (A.)
Pathologie chirurgicale.....	(GOSSET (J.)
	(LAURENCE (G.)
	(LORTAT-JACOB (J.)
	(OLIVIER (Cl)
	(POILLEUX (F.)
	(THOMERET (G.)
	(VERNE (J. M.)
	(N...N...
Pathologie expérimentale.....	(LEOPER (J.)
	(MAURICE (P.)
	(HAGUENAU (J.) pr.s.ch.
	(BOUDIN (G.)
Pathologie médicale.....	(BOUVIER (J. B.)
	(BRICAINE (H.)
	(BRISAUD (H.)
	(CASTAIGNE (P.)
	(CONTE (M.)
	(DEROT (M.)
	(DOMART (A.)
	(LAMOTTE (M.)

1. The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the

the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the

the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the

Grâce à l'impulsion des internistes comme des obstétriciens, le syndrome dit de " toxique gravidique " a été l'objet, au cours de ces dernières années, d'un effort de classification tendant à élargir nos conceptions à propos de cette affection. On s'est ainsi défini un certain nombre de cadres, qui, pour mal délimités qu'ils soient, représentent une base de travail pour les études ultérieures. De nombreux classements ont été proposés. Nous nous bornerons ici à citer trois grands ordres de manifestations:

- 1) Les néphropathies gravidiques pures et sans antécédents survenant lors d'une première grossesse et ne se reproduisant jamais.
- 2) Les néphropathies gravidiques secondaires, survenant sur un terrain déjà lésé, en particulier par

une hypertension artérielle permanente ou intermittente, ou une affection rénale chronique.

3) Les hypertensions gravidiques récidivantes (HGR) qui sont l'objet de ce travail.

Il est en présence 19 cas (présentés, en 11 cas, par l'abbé révérend le Professeur Pasteur Vallery-Radot et le Professeur Milliez, qui nous ont permis de publier ces cas recueillis dans le service, et dans la clinique Marnatienne sous la direction de l'abbé de cette étude.

Ces HGR sont particulièrement intéressantes, car elles représentent un pont, une transition entre les deux autres types, mais la transition à l'étude du diagnostic différentiel, les frontières dans une direction comme dans l'autre en sont parfois un peu floues.

L'incertitude qui régit sur la cause comme sur le mécanisme de l'affection se reflète dans la multitude des termes qui lui ont été appliqués : "dysgravide récidivante", "éclampsie récidivante", "éclampsie récidivante" etc... Le terme que nous avons adopté après Milliez qui, en France a largement contribué à l'étude des hypertensions gravidiques et à leur traitement est celui de "hypertension gravidique récidivante".

Hyperextension articulaire, œdème, etc., tous
représentant en effet la base clinique de syndrome
sans réserve qui est la manifestation de l'hyperextension
occure de la grossesse, qu'elle se produise
complètement dans un délai restreint mais brief après
la parturition, ou que son développement trans-
itoire se répète au cours de grossesses ultérieures.

A ce tableau peuvent venir s'ajouter des com-
plications réelles (infectées) ou surtout pathologiques
spéciales, comme les puerpérales, les hémorragies, mais
il s'agit là de complications des perturbations
causées par l'hyperextension plutôt que de manifestations
autonomes.

De nombreux travaux ont été publiés sur les
modifications biologiques, hormonales, anatomi-
pathologiques au cours de la toxémie gravidique.
Les interprétations pathologiques sont légion,
mais, jusqu'à présent, aucune ne s'est élevée au
niveau d'hypothèse dont la preuve expérimentale ou biolo-
gique ne peut être apportée de façon suffisante,
au point que Van Beneden, Jkbeastien et Maerboom ont
pu dire que la toxémie gravidique était la " maladie
des hypothèses".

Notre intention n'est pas de proposer une
nouvelle interprétation pathologique de cette

à l'occasion des 19 observations d'hypertension
généralisée résiduelle que nous rapportons, de
faire le point des connaissances acquises au
cours de ces dernières années et de regrouper les
hypothèses émises dans un ensemble qui s'efforcera
d'être cohérent.

L'intrication des différents facteurs élimi-
nés et biologiques qui composent les HGR rend dif-
ficile un exposé clair et bien tranché. Hyperten-
sion artérielle, rétention hydrosoluble, lésions
rénales, modifications hormonales, modifications
anatomiques-pathologiques sont en effet entrelacés de
telle sorte qu'il est souvent impossible de dégager
un enchaînement logique. Le plan d'étude que nous
proposons n'est cependant nécessairement, pourant
revenir à quelques points essentiels. Il paraît cepen-
dant avoir l'avantage de la clarté d'exposition
d'être cohérent dans une question aussi
complexe.

II - ASPECTS CLINIQUES

- Clinique
- Diagnostic
- Pronostic fœtal et neonatal.

III - Modifications biochimiques et pathophysiologiques au cours du syndrome de l'hyperplasie néonatale

- a) La rétention hydro-électrolytique sodique
- b) Les modifications rénales
- c) Les modifications endocriniennes
- d) Lypoprotéidémie
- e) Les modifications hormonales
- f) Les lésions anatomiques

IV - Mécanisme des troubles observés dans le syndrome de l'hyperplasie néonatale

- a) Les modifications hormonales
- b) La rétention hydro-électrolytique
- c) L'hypertension artérielle
- d) Mécanisme général du syndrome toxémique, une

Exposition

V - Les facteurs étiologiques de l'HPN

- a) L'hypertension artérielle permanente
- b) L'insuffisance rénale latente
- c) Les malformations congénitales
- d) Les facteurs génétiques et in utero

OBSERVATION NUMERO 1

B.... Jeanne - Née en 1931

ANTECEDENTS PERSONNELS: Néant

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Grand-mère et grand-père paternelles " albuminuriques "

1ère grossesse en 1950 - malade âgée de 20 ans.

Au cours de l'accouchement, albuminurie et HTA à 180-? . Accouchement à terme d'un enfant mort: réanimation inefficace. Poids de 700 grammes avec un développement retardé sans autre anomalie morphologique.

2ème grossesse en 1951 - malade âgée de 21 ans.

Au cours de la grossesse, albuminurie. La TA ne s'élève pas au-dessus de 140-80.

Accouchement normal au delà du terme d'un enfant en anoxie de 4.750 grammes. Réanimation, enfant animé de mouvements convulsifs. Placenta de 850 grammes (pas de précision).

Adressée pour bilan

Bon état apparent, examen clinique négatif, TA 120-70.

Epreuves réelles biologiques entièrement normales.

Fond d'oeil normal.

Gold pressor test normal.

OBSERVATION NO. 2

Mme B. . Louise - Née en 1908.

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS: 11 grossesses antérieures. Au cours de chacune de ces grossesses la malade eut une oedème, céphalée, polyurie et la TA s'éleva au-dessus de la normale. On n'aurait jamais retrouvé d'albuminurie. Cependant, 9 de ces grossesses sont menées à bien avec accouchement normal d'un fœtus à terme. Deux grossesses se compliquant de placenta praevia et l'accouchement donna naissance à des morts-nés. Pas d'autres antécédents personnels. La TA redescendrait à des chiffres absolument normaux entre les grossesses.

ANTECÉDENTS FAMILIAUX: Néant.

Adressée dans le service par le Docteur Robey pour anurie totale apparue à la suite de son 12ème accouchement.

Malade âgée de 44 ans.

Au 8ème mois de cette grossesse, l'examen montrait un oedème malléolaire et la TA s'élevait à 180-130. On conseillait à la malade de suivre un régime sans sel. Accouchement le 27 Septembre 1952, à terme, d'une fille mort-née de 3,250 kg. L'examen de la délivrance montre l'existence d'un hématome retro-placentaire. Les suites immédiates sont compliquées par l'apparition d'hémorragies abondantes par inertie utérine; 2 transfusions de 300 cm³, un méchage local, des injections d'extract post-hypophysaire et d'ergotine sont nécessaires. La malade est en état de choc, la TA tombant à 105-80. Le lendemain s'installe une anurie totale qui va durer 36 heures, traitée par sérum glucose et bicarbonate en perfusion, anti-biothérapie et hormonothérapie. Le 30 septembre la diurèse se rétablit, augmentant progressivement pour atteindre 1,500 cm³ le 5 Octobre et se maintenir à ce chiffre. Mais, malgré une exsanguino-transfusion, l'urée sanguine reste aux alentours de 3grs. La concentration uréique urinaire est basse (6 grs par litre.) La réserve alcaline est à 40 volumes.

A l'entrée dans le service

Malade fatiguée, obnubilée, secouée par un hoquet, et porteuse d'un urticaire diffus. La température est à 37 degrés.

On trouve une TA élevée à 165-100. Au coeur: il existe peut-être un frottement péricardique discret.

Urée sanguine 3grs70. Urée urinaire 4,20 grs -
RA 36 volumes. Elle est mise à un traitement comprenant
un régime du type Kempner, du sérum bicarbonate et
glucose en perfusion, des analeptiques cardio-vasculaire,
et du chloramphenicol (2 grs par jour).

Le 8 Octobre: malade moins fatiguée, disparition du
hoquet, diminution de l'urticaire et de l'œdème des
membres inférieurs.

La TA est redescendue progressivement à 140-90.
Cependant que la diuresis s'élève à 2 900 cm³, l'urée
sanguine reste aux alentours de 3 grs. Le culot uri-
naire montre une leucocyterie. La RA est à 47 volumes.
Peu à peu, l'amélioration va s'affirmer et le 30 Octobre
le bilan est satisfaisant:

Examen clinique normal. La TA varie entre 110-70 et
130-90. L'urée sanguine est à 0,50 grs mais la concen-
tration urinaire reste basse (6 grs par litre).
Le bilan renal montre des altérations encore importantes.
PSP à 30% en 70 minutes, le Van Slyke avec une clearance
standard à 15CC.

On laisse sortir le malade avec le régime de Kempner.
Mais une surveillance étroite continue d'être exercée.
Entre Décembre 1952 et Juin 1953, l'urée oscille entre
0,32 et 0,50 grs.

En Avril 1955, un nouveau bilan renal est pratiqué
Clearance tubulaire : 380 cc)
Clearance glomerulaire: 60 cc) donc encore perturbées

Malade revue en 1957.

La TA se maintient aux alentours de 210- ? montant
parfois jusqu'à 270-?

OBSERVATION NO. 2

B... Forche - Née en 1914.

ANTECEDENTS PERSONNELS: Paludisme en Algérie vers l'âge de 10 ans. Mestoidite droite opérée à 13 ans.

ANTECEDENTS FAMILIAUX:

Mère hypertendue depuis 15 ans.
Cinq sœurs dont 3 auraient présenté des troubles mal précisés au cours de grossesses (Télonephrite?).
Père et un frère bien portants non hypertendus.

1ère grossesse en 1919: malade âgée de 25 ans.
Avortement spontané à 2 mois.

2ème grossesse en 1942 - malade âgée de 28 ans.
Normale jusqu'à 7 mois et demi. A ce moment apparition de fatigue et de douleurs abdominales suivies de crises d'éclampsie. Admise en clinique: disparition des crises mais la TA est à 280-? et l'on retrouve une albuminurie de 7 grs.
15 jours après, accouchement spontané d'un enfant vivant de 7 mois et demi qui meurt une heure après la naissance. La malade sort en excellent état. La TA vérifiée depuis à plusieurs reprises n'a jamais excédé 130-?

3ème grossesse: Débutée réglée juin 1947. Malade âgée de 33 ans.

Evolution normale jusqu'au 7ème mois, à ce moment, an-
gousses systématiques d'une TA à 180-? y variaient
malgré le repos et le régime désodé.
Envoyée pour bilan. Aucune trouble fonctionnel.
Epreuves rénales biologiques normales.
TA entre 150-160 et 180-115. Albuminurie à l'état de
traces à l'entrée disparaissant rapidement.
Fond d'oeil normal.
Cold pressing test négatif. Pericardé d'après une expansion
de 40 mm.

La malade est revue en Décembre 1948.

Test global rénal: TA 115-80 mais cold pressing
test encore largement positif.

Les urographies intra-veineuses sont normales.

Les hystérogaphies montrent l'existence d'un utérus petit
légèrement infantile.

OBSERVATION NO. 4

C..... Georgette - Malade âgée de 24 ans.

ANTECEDENTS PERSONNELS : maladies infectieuses banales -
Scarlatine à l'âge de 22 ans diagnostiquée rétrospectivement
sur la desquamation, sans néphrite apparue.

ANTECEDENTS FAMILIAUX : Mère soignée pour " le cœur "
Décédée d'une embolie à 75 ans.

1ère grossesse 1947 - malade âgée de 24 ans.

Examens prénataux normaux jusqu'au 4ème mois. A ce moment
oedème plus, albuminurie plus, TA 180-130. Les bruits du
cœur et les mouvements fœtaux ne sont pas perdus.
Le régime déchloruré fait disparaître l'oedème et l'
albuminurie. La malade pense qu'elle a le soir même
accouchement d'un fœtus macéré de 4 mois.
Rehospitalisée pour rétention placentaire. A ce moment
albuminurie 0, TA 115-60.

Adressée pour bilan dans le service du Docteur
Vallery-Radot:

Examen clinique négatif, TA 115-60

Examens rénaux, cardio vasculaires, oculaires normaux.

Urographies normales, cold pressor test et test à l'effort
normaux.

2ème grossesse 1949 - malade âgée de 26 ans.

Malade suivie régulièrement par le Professeur Millaud.
2ème mois: Hospitalisée pour prise de poids anormale
1,300 gr en 15 jours et TA à 140-100.
Bilan cardio-rénal normal
Mise au régime déchloruré: perte de poids
Sort en bon état.

A terme: TA 170-110, ni albuminurie ni oedème
Accouchement normal d'un enfant de 2,820 grs.
Placenta de 600 grs, siège d'infarctus blancs.
Un mois après accouchement:
TA 120-80, albuminurie 0 - Etat général excellent

Retue en 1957. Va très bien, aucune modification.
TA 125-70 - Cold pressor test négatif
Son enfant âgé de 8 ans a fait une crise de
post-angineuse en 1946, suivie d'albuminurie de
mois et d'hématurie pendant 9 mois.

OBSERVATION NO. 6

Mme D... Suzanne- Née le 24 Juin 1914.

ANTECEDENTS PERSONNELS: Scarlatine avec néphrite albuminurique à l'âge de 5 ans. Crise rhumatismale à 15 ans de nature indéterminée sans séquelles. Nombreuses crises de furonculose.

Pleurésie droite en 1950 à l'âge de 35 ans, traité par l'isoniazide pendant 3 mois.

Infiltrat sous-épicardique en 1952 à l'âge de 36 ans. Tubages toujours négatifs.

ANTECEDENTS FAMILIAUX:

Mari décédé de tuberculose en 1954.

Mère sujette à des crises de colique néphrétique. Rien par ailleurs.

1ère grossesse en 1941 - Malade âgée de 27 ans.

Grossesse normale sans cédème hypertension ni symptômes. Accouchement à 4 mois d'une fille vivante de 3 kg.

Dans la puerpération, apparition d'un pyélonéphrite récurrente bilatérale dont la phase aigue cède à un traitement par la sulf.

Entre ce moment et 1946, persistance d'une coléctasie et d'une dysurie chronique.

2ème grossesse - âgée de 32 ans.

Aucun trouble subjectif ou objectif.

Accouchement normal à terme en Janvier 1946.

3ème grossesse - Malade âgée de 35 ans.

Pendant toute la grossesse, lombalgies bilatérales, vertébrales, articulaires, céphalées, céphalées. Mais la TA reste normale, il n'y a pas d'albuminurie. Accouchement normal en Septembre 1947 d'un enfant vivant.

4ème grossesse - Malade âgée de 36 ans.

Déroulement normal de la grossesse mais prise de poids exagéré dans les derniers mois avec signes de pré-éclampsie. Lors de l'accouchement, crises d'éclampsie atypiques sans perte de conscience. La TA est à 140-110. Il existe une albuminurie. Accouchement d'un fœtus mort de 3 kg. 3 kgs. Il existe un hématome retro-placentaire. Dans les suites, retour de la TA à la normale.

5ème grossesse - Malade âgée de 38 ans

Avortement spontané à 3 mois et demi.

OBSERVATION NO. 5 (Suite)

6ème grossesse - Malade âgée de 40 ans.
Céphalées, troubles digestifs pendant toute la grossesse.
Lors de l'accouchement en Juin 1954, à 8 mois et demi,
hématome retro-placentaire, crise d'éclampsie, évacuation
d'un enfant mort-né de 3,130 kg.

Le TA et le fond d'oeil auraient été normaux. Il existait une légère albuminurie.
Dans les suites, syndrome abdominal aigue étiqueté,
torsion de kyste de l'ovaire.

Malade adressée pour un bilan

Se plaint de épisodes d'effort et de crises nocturnes
d'allure asthmatique depuis deux ans.
Coeur: Petit coeur. Systolique de pointe - TA variable
entre 120-80 et 150-80.
Poumons: silencieux normaux. Radiographies: images cicatricielles.
Pas de HT et des bacilloscopies répétées.
Bilan rénal: pas de HT dans les urines.
Glomérules tubulaires et glomérulaires normaux. Discrets
éléments à la sédimentation des éléments-minuts.
Urographes IV: discrets anarchie calicelle avec stase.

1. The first of the three main types of the bird is the

2. The second of the three main types of the bird is the

3. The third of the three main types of the bird is the

4. The fourth of the three main types of the bird is the

5. The fifth of the three main types of the bird is the

6. The sixth of the three main types of the bird is the

7. The seventh of the three main types of the bird is the

8. The eighth of the three main types of the bird is the

9. The ninth of the three main types of the bird is the

10. The tenth of the three main types of the bird is the

11. The eleventh of the three main types of the bird is the

12. The twelfth of the three main types of the bird is the

13. The thirteenth of the three main types of the bird is the

14. The fourteenth of the three main types of the bird is the

15. The fifteenth of the three main types of the bird is the

OBSERVATION NO. 6

Mme D.,., Yvonne - Née le 10 Septembre 1929

ANTECEDENTS PERSONNELS: Diphthérie à 6 mois - Episode pulmonaire à l'âge de 15 ans accompagné d'hémoptysie. La cuti-réaction était positive à ce moment. La bronchoscopie avait été négative. Six mois de repos. Pas d'autres manifestations pulmonaires depuis cette époque.

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Néant.

1ère grossesse: normale

2ème et 3ème grossesses: Apparition d'une hypertension à 170 et d'une albuminurie de 10 gr dans les derniers mois. Pyélonéphrite après la 3ème grossesse.

Adressée pour bilan à cause d'une fatigue générale.

Malade âgée de 25 ans.

Examen clinique normal

TA 130-75

Épreuves biologiques sanguines normales: pas de BK dans les urines.

Urographies intra-veineuses normales.

Fond d'oeil normal

EKG normal.

OBSERVATION NO. 7

E..... Gisèle - Née en 1916

ANTECEDENTS PERSONNELS: Neant

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Pas d'HTA dans l'ascendance. Fris de 4 ans aurait fait une néphrite aigue oedémateuse à frigore.

1ère grossesse en 1939 à l'âge de 24 ans.
Prise de poids prise de poids
découverte d'une albuminurie; TA non connue.
Mise au régime lacté.
Accouchement normal à terme d'un enfant de 4.000 grs.
Placenta ?

2ème grossesse en 1944, à l'âge de 28 ans.
Histoire exactement identique.
Accouchement normal d'un enfant vivant de 2.700 grs.

Depuis ce moment, aucune vérification de l'albuminurie ou de la TA. A 33 ans (1951) épisodes répétés de dysurie et de pollakiurie.

3ème grossesse en 1954 - Malade âgée de 38 ans.
Suivie régulièrement. Jamais d'albuminurie - TA restant entre 105-75 et 110-80.
Au 6ème mois: oedème de la face et des MI, albuminurie à l'état de traces, TA 140-95. Mise au régime désodé.
Au 7ème mois et demi, alors que les oedèmes ont disparu, qu'on ne retrouve pas d'albuminurie et que la TA est à 120-80 accouchement prématuré d'un fœtus mesurant de 1.900 grs. Le placenta est le siège de nombreux infarctus blancs. Durant l'accouchement, on retrouvait une albuminurie à 3 grs et la TA s'élevait à 180-120.
Dans les suites, l'albuminurie disparaît en une dizaine de jours, la TA redescend rapidement à 115-70.

La malade est adressée dans le service pour un examen de reins. L'examen montre des reins dont l'opacité développée depuis le dernier accouchement. La TA à des prises successives oscille entre 115-70 et 145-90.
Il n'y a pas d'albuminurie. Mais une albuminurie modérée avec colliculopathie.

Les électrolytes sont légèrement perturbés (voir les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 208

OBSERVATION NO. 7 (SUITE)

La malade est suivie pendant 6 mois et la T_g n'excède jamais 120-70, présente par poussées de la pollakiurie et de la dysurie, quelques vertiges attribués à une cause labyrinthique, et un embonpoint croissant.

OBSERVATION NO. 8

E..... Jeanine- Née en 1926

ANTECEDENTS PERSONNELS: Néant

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Néant

1ère grossesse en 1947- Malade âgée de 21 ans.

Vers la fin du 5ème mois, apparition d'un oedème des chevilles, des mains et du visage.

10 jours plus tard, brutalement au réveil, céphalée violente avec vomissements sans convulsion ni perte de connaissance. On constate à ce moment une TA à 210- ? et une albuminurie à 10 grs.

Le lendemain, nouvel accident identique. La malade est transférée à l'hôpital pour être placée au régime lacté. Les accidents ne se reproduisent pas, l'oedème s'estompe et 3 semaines après, à 6 mois et demi, accouchement spontané d'un enfant de 1200 grs (DCD à 8 mois d'une broncho-pneumonie).

Trois ou 4 jours après l'accouchement, disparition de l'albuminurie. La TA se serait stabilisée autour de 140 de maxima.

2ème grossesse en 1948- Malade âgée de 22 ans.

Au 6ème mois, TA 120-70; pas d'albuminurie.

A partir de la fin du 7ème mois, on constate au passage des traces d'albuminurie et la TA se maintient aux alentours de 140-90.

A 8 mois et demi, accouchement spontané d'un enfant vivant pesant 1.800 grs. Placenta de 350 grs. Enfant décède 24 heures après.

La malade est adressée 3 mois après l'accouchement pour bilan rénal. L'état général est bon, la TA se maintient entre 125-70 et 130-80.

Le bilan biologique et radiographique des reins est normal. Le fond d'oeil et l'ECG sont normaux.

Les hystérogammes ne montrent aucune anomalie.

OBSERVATION NO. 9

F.... Gisèle - Née en 1928.

ANTECEDENTS PERSONNELS: Angines à répétition dans l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans où amygdalotomie. Jamais de complications rénales. A 18 ans, épisode de pyélonéphrite traitée par le thiazomide et ne s'étant jamais reproduit depuis.

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Grand-père aurait fait des néphropathies gravidiques. Mère 48 ans bien portante non hypertendue. Aurait fait une albuminurie lors d'une 3ème grossesse par ailleurs normale. Une sœur bien portante ayant porté à bien 3 grossesses normales. TA jamais prise avant.

1ère grossesse en 1953 à 24 ans.

Jusqu'au 6ème mois, courbe de poids normale - TA entre 110-60 et 130-70;

Au 6ème mois, apparition d'œdème de la face, des doigts, des MI. TA à 160-7. Pas d'albuminurie.

Mise au repos, au régime d'osérol non strict.

3 semaines plus tard, accouchement spontané d'un fœtus macéré de 2.050 grs. État du placenta non connu.

Après l'accouchement, disparition des œdèmes, la TA serait revenue à des chiffres normaux. On ne pratique pas d'épreuves rénales.

Aucun trouble, TA normale jusqu'à:

2ème grossesse en 1954 à l'âge de 25 ans.

Mise d'emblée au régime d'osérol: Jusqu'au 6ème mois, aucun trouble subjectif ou objectif.

Au 6ème mois, l'apparition d'œdème discret des doigts, d'une céphalée entraîne l'hospitalisation: TA à 140-70

albuminurie à 1 gr par 24 heures. Régime d'osérol strict et traitement par le di-éthyl-stilboestrol (dose non précisée.).

Disparition de l'œdème et de l'albuminurie, mais persistance de l'élévation de la TA qui reste autour de 145 de maxima.

Accouchement spontané à 7 mois d'un fœtus mort-né non macéré de 1.050 grs. Le placenta pèse 320 grs. (état non précisé). Durant l'accouchement, la TA s'était élevée à 160 de maxima. Immédiatement après l'accouchement, retour de la TA à 130. Disparition de l'albuminurie et de l'œdème.

Envoyée dans le service pour bilan.

Tension au jour de l'admission: tension artérielle normale.

24 heures: tension artérielle normale, quelques points normaux.

24 heures: tension artérielle normale, quelques points normaux.

24 heures: tension artérielle normale à 130-80.

OBSERVATION NO. 11

G..... Simone - Née en 1916

ANTECEDENTS PERSONNELS: Néant

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Néant

1ère grossesse en 1946- Malade âgée de 31 ans
Enfant né au 8ème mois pesant 2500 grs.
Placenta de 400 grs (état non précisé)

2ème grossesse en 1953. Malade âgée de 35 ans
La TA aurait été aux alentours de 130- ?
Avortement à 5 mois et demi.

3ème grossesse en 1955- malade âgée de 37 ans
5ème mois: Albuminurie à 7 grs- TA à 200-100
Accouchement prématuré au 7ème mois d'un fœtus mesuré
de 970 grs. Placenta de 150 grs. " anormal " (sans autres
précisions).

Bilan pratique à ce moment.

La TA est à 160-90

Il existe quelques altérations rénales: PSP à 30% en 70
minutes. Hématies minuscules à 17,200

FO normaux avec pression artérielle rétinienne à 90

Par la suite la malade est suivie à la consultation: elle
se plaint de céphalées fréquentes et sa TA se maintient aux
alentours de 150-90.

4ème grossesse - Régulières règles en février 1957- Malade
âgée de 39 ans.

3ème mois: Céphalées, TA à 150-80, pas d'albuminurie. Les
dosages hormonaux montrent l'existence d'une insuffisance
folliculinique modérée.

5ème mois: Pas d'œdème, pas d'albuminurie, TA à 140-80.

7ème mois: Céphalée, pas d'œdème ni d'albuminurie, la
TA est à 190-100. Les dosages hormonaux montrent une in-
suffisance portant à la fois sur la folliculine et la pro-
gesterone. La malade signale qu'elle ne sent plus remuer
l'enfant, la malade est hospitalisée le 30 septembre 1957.
On trouve alors une albuminurie à 0,50 grs, une TA à
140-90. La malade doit être transférée d'urgence à la
clinique Tarnier le 1er octobre 1957 où elle accouche d'un
fœtus mort-né. État de placenta non précisé.

Revient dans le service le 9 Octobre pour bilan

Albuminurie: 0 - TA se maintenant à 130-70.

Épreuves rénales à la limite inférieure de la normale.

FO normaux mais pression artérielle à 60.

Cold Pressor test négatif. Urogramme normal.

OBSERVATION NO. 12

G..... Marie Therese - Née en 1918.

ANTECEDENTS PERSONNELS: A 15 ans, éruption vésiculaire compliquée. Malade portesse d'une maladie de Poxi-malade cutanée.

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Mère, la mère et une sœur ont eu des grossesses normales.

1ère grossesse en 1941 - Malade âgée de 23 ans.
A 7 mois et demi, apparition brusque de vertiges, nausées, vomissements. La TA est à 220 - 90. Il existe une albuminurie massive. Aménorrhée transitoire et crises épileptiques dans la nuit.
Le lendemain amélioration. TA 170/90. L'enfant serait encore vivant. Quatre jours plus tard, apparition d'un enfant mort-né de 1.500 grs. Placenta normal de 100 grs. Dans les jours qui suivent, albuminurie de 17 grammes/jour. TA à 130-70.

2ème grossesse en 1942 - malade âgée de 24 ans.
Avortement spontané à 2 mois et demi: ni albuminurie ni HTA.

3ème grossesse en 1944 - malade âgée de 26 ans.
Au 7ème mois, apparition brusque de la TA à 220 - 90. Découverte d'une albuminurie à 3 grs.
Malgré la médication, l'accouchement a lieu à 8 mois d'un enfant mort-né de 1.600 grs. Tout rentre dans l'ordre dans les jours suivants.

4ème grossesse en 1945 - malade âgée de 27 ans.
Même succession des troubles - accouchements à 8 mois d'un enfant mort-né de 1.600 grs.
Malade suivie et traitée par la médication dépressive de l'incompatibilité Rh.

5ème grossesse: Dernières règles en Juillet 1947. Malade âgée de 29 ans. La malade est adressée dans le service pour bilan.

Sa TA est à 135-80.

Le bilan rénal, biologique, les urographies intra-veineuses, le fond d'oeil, l'ECG sont normaux.

Le 24 Octobre, au 4ème mois, elle est hospitalisée pour une menace d'avortement. Examen obstétrical et général normal.

Janvier 1948, au 7ème mois de la grossesse. Découverte d'une TA à 160-110 et d'une albuminurie à l'état de traces. La malade reste hospitalisée pendant deux mois. Sous l'influence du traitement, la TA revient à la normale et l'albuminurie disparaît.

OBSERVATION NO. 12 (Suite)

Pendant cette période, on pratique un nouveau bilan biologique qui s'avère à nouveau normal.

Le cold pressor test est normal.

Cependant, accouchement au 8ème mois d'un fœtus mort mœéré.

Placenta normal de 190 grs.

Puis tout rentre dans l'ordre. La malade quitte la clinique sans œdème ni albuminurie avec une TA à 135-90.

Une hystérogaphie pratiquée ne montre aucune anomalie utérine.

La malade revue en Janvier 1949 est en parfaite santé. Sa TA est à 140-90.

OBSERVATION N° 13

Mme H..... Lucette - Née en 1924.

ANTÉCÉDENTS PATHOLOGIQUES: Agénésie fréquente depuis l'âge de 10 ans jusqu'à la puberté. (14 ans). TA jamais prise avant la grossesse.

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX: Sèche

1ère grossesse: Menstrues réglées le 22 août 1947. Age: 24 ans. 4ème mois: Apparition d'une albuminurie, TA normales, pas d'œdème. Mise en régime décaloruré, disparition de l'albuminurie. 5ème mois: réapparition de l'albuminurie (0,15 gr) sans œdème ni HTA. 6ème mois: apparition progressive d'un œdème, albuminurie à 4 grs, TA à 140-150. Hospitalisée à Saint Louis où tous les examens pratiqués sont normaux. Accouchement normal d'un fœtus macéré de 7 mois et demi.

Bilan post-partum: Examen clinique négatif. TA 125-70 Poids 57 kg et pression artérielle systolique normale. Bilan rénal normal - uré normal. Cold pressor test et test à l'effort normaux.

2ème grossesse: Juillet 1948 - Age 25 ans.

Menstrues régulières pendant toute la grossesse. Recollé 15 jours de civilité par jour et maintenant le repos au lit, régime décaloruré.

3ème mois: Perte de poids de 20 kg en 20 jours, apparition d'une albuminurie (0,10) TA à 140-70.

Hospitalisée; traitement de la thérapie par le distillat, régime décaloruré strict. Sous l'influence de ce traitement disparition de l'albuminurie, retour de la TA à 120-60 perte de poids de 100 grs en 16 jours. Accouchement normal d'une fille bien portante de 3450 g en Mars 1949.

3ème grossesse: Age 26 ans. Régime décaloruré maintenu pendant toute la grossesse. Evolution normale sans hypertension ni albuminurie. Accouchement d'un garçon bien portant en Juillet 1950.

4ème grossesse: Accouchement à 4 mois et demi. TA non prise pendant cette grossesse.

5ème grossesse: Age 27 ans

Menstrues régulières pendant toute la grossesse. La TA ne dépasse pas 140/90. Les examens de laboratoire sont normaux. Accouchement normal d'une fille bien portante de 3450 g en Mars 1951.

OBSERVATION NO. 10

N. 106314 - 106315 - 106316

Renseignements médicaux - 106314 - 106315 - 106316

1ère grossesse en 1952 - Malade âgée de 24 ans.
Accident éclamptique à 8 mois et demi - TA à 205-?
à 205-200.

2ème grossesse en 1953 - Malade âgée de 24 ans.
Surveillée régulièrement. TA en permanence entre 150-90
et 160-100. Mais aucun troubles fonctionnels, cours de
glaucome, pas d'albuminurie.
Taux de folliculine et de pregnadiol normaux.
Régime des dernières semaines de la grossesse, régime sans
sel et sans de 500 grammes d'éthyl oestradiol par jour.
Grossesse à terme en Janvier 1954; enfant vivant de
3,200 grs.
Poids de 600 grs., présentant des lésions microscopiques
des artères artérielles de moyen calibre essentiellement.

Après le 106314 - 106315 - 106316, le 106317
pour se plus remonter au-dessus de ce chiffre.

OBSERVATION NO. 14

Mme K..... Marie - 38 ans 1847

ANTECEDENTS HEREDITAIRES : Sœur

ANTECEDENTS PATHOLOGIQUES : Sœur.

1ère Grossesse - 38 ans - normale jusqu'en 4ème mois.
A ce moment, survenue de grossesses tuba les entraînant une in-
tervention d'urgence avec éklésie de l'ovaire droit, la
TA = toujours très normale.
Majot en très bonne santé pendant 3 ans.

2ème grossesse - 41 ans - Malade régulièrement suivie. Sur-
venue jusqu'en 4ème mois, à ce moment, élévation progressive
de la TA qui atteint 240 de maxime. Minusculaire secondaires,
persistantes de nos jours jusqu'en 4ème mois sans aucun mani-
festation fonctionnelle.
4ème mois : disparition des mouvements fœtaux et accouche-
ment assisté d'un fortin mort 5 jours après.
Dans les jours suivants, crises de spasme avec cyanose,
soulagée par une saignée.
Tuba retour de la TA à un chiffre normal, disparition de 1^{re}
éklésie.
Après évacuation fonctionnelle et subjective pendant 3 ans.

3ème grossesse - 43 ans

Régulièrement suivie en raison des antécédents. Survenue
jusqu'en 4ème mois : élévation progressive de la TA (chiffres
non précis).

7ème mois : sensation de douleurs éklésiologiques en larrs
à prédominance maternelle et disparition de mouvements et des
bruits du cœur fœtal.

Examen aklés normal : pas d'élésie - TA 200-110.

Examen fœtal, éklésie et vertèbres portées.

Fœtus morté éklésiologiquement et sous éklésie surveillance.

Retour à la normale de la TA dans les heures de l'accouchement.

11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947
11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

11. 11. 1947 - 11. 11. 1947

OBSERVATION NO. 16

Mme L..... Marcelle - Née en 1929.

ANTECEDENTS PERSONNELS: Dans l'enfance: rougeole, coqueluche, scarlatine, fièvre typhoïde, non compliquées. Aucun autre antécédent.

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Parents bien portants, pas d'hypertension artérielle. Une sœur a eu une grossesse sans hypertension ni albuminurie.

1ère grossesse: en 1950 à l'âge de 21 ans.
TA non prise jusqu'au 8ème mois: TA 150-80, traces d'albumine dans les urines, pas d'œdème. Surveillance régulière jusqu'à la fin de la grossesse.
A ce moment, tension artérielle à 100-110, persistance d'une albuminurie discrète, pas d'œdème.
Accouchement normal (forceps) à terme d'un enfant normal de 2.630 grs. Le placenta aurait été normal.
Quelques jours après l'accouchement, retour de la TA à 130-70, disparition de l'albuminurie.
Le TA n'a jamais été reprise depuis la grossesse.

2ème grossesse: en 1951 à l'âge de 22 ans.
8ème mois: TA 120-50, pas d'albuminurie, ni d'œdème.
6ème mois: TA 140-110, traces d'albumine dans les urines, apparition d'un léger œdème des mains, des jambes et de la face.
Le malade est mise au régime désodé qui entraîne la disparition de l'œdème et la perte de 2.500 grs en 10 jours.

A l'entrée: Malade au 7ème mois de sa grossesse en bon état apparent.
Examen clinique complètement négatif, pas d'œdème.
TA en permanence à 130-110, albuminurie se manifestant autour de 0.75 grs/24 heures.

Le bilan rénal montre une VPM à 55 ml en 15 minutes, la Vm Stuydonk la clairance standard est de 15%, rien d'autre par ailleurs. FFR normal, fon d'œil normal. Dosage de 17 ceto-stéroïdes et des corticoïdes normaux.

Dépendant les troubles de cœur, encore présents le 29 octobre 1951 (fin du 8ème mois), sont améliorés le 29 octobre. La malade souffre d'un trouble persistant de 1.950 grs. Le placenta est normal, sans complication et à l'issue normale.

OBSERVATION NO. 17

P..... Renée - 27 ans.

Entre dans le service le 2 Janvier 1949.

ANTÉCÉDENTS : pas de maladie rénale connue depuis l'enfance, de diabète. Jamais avait pu faire de néphrite.

INTERVIEW : patiente a été mariée à 17 ans, a eu 3 enfants, 2 garçons et 1 fille, tous vivants et en bonne santé. Rien par ailleurs.

1ère grossesse en 1946 à l'âge de 24 ans. Examens normaux jusqu'au 7ème mois et demi. A cette époque : baisse des urines et du sang - 24 heures. Pas d'alimentation. A été hospitalisée à l'hôpital de 200, albuminurie : plus; crise d'égéopsie.

Accouchement d'un enfant de 3kg850 décollé à 40 mois et demi d'hémorragie méningée.

Retour chez elle 15 jours après l'accouchement avec TA à 140-90 sans albuminurie.

Pas d'examen ni de troubles jusqu'à

2ème grossesse en 1948 à l'âge de 27 ans.

Écou de grossesse normal jusqu'au 7ème mois. A ce moment : TA à 170-100. Albuminurie 0; ni sucre ni sucre.

Examen clinique : normal.

Analyses :

Van Slyke : concentration normale

PSP, 45% en 70 minutes

UIV : Hydronéphrose droite excédant l'hydronéphrose physiologique de la grossesse.

CPT négatif.

La malade sort avec un traitement par chlorure de sodium.

OBSERVATION NO. 18

Mme R..... Marie Louise- Née en 1926

ANTECEDENTS PERSONNELS: Bronchite chronique, rougeole, coqueluche, varicelle dans l'enfance. Une angine disséminée et non compliquée en 1939 (13 ans).

ANTECEDENTS FAMILIAUX: Grand-père maternel décédé d'un ictus apoplectique, hypertendu connu.
Père porteur d'une hypertension à plus de 190 de maxime. Il a fait une hémiplegie gauche en 1936.
Mère décédée de grippe infectieuse en 1918.
Un frère non hypertendu.

Histoire de la maladie

Découverte fortuite d'une TA à 155-120 en 1944 (18 ans)

1ère grossesse: début juillet 1947, à l'âge de 21 ans.
5ème mois: TA 130-50, pas d'albuminurie.
1er Mars 1948 (fin 7ème mois): TA 130-80, albuminurie à l'état de traces, pas d'œdème. Le régime désoxo fait disparaître l'albuminurie. Le 28 Mars (fin 8ème mois): installation rapide d'un syndrome œdémateux. On TA à ce moment est à 110-80, pas d'albuminurie. Le syndrome œdémateux persiste malgré le régime.
Le 10 Avril: début de travail. On découvre une albuminurie massive. La TA est à 210 pour la maxime. Accouchement d'un fœtus mort-né de 1.250 grs. Remède retro-physiologique.
Suites: Baisse de la TA à 150 de maxime dans les dix jours avec disparition progressive de l'albuminurie.

Adressée pour Milan le 2 Mai 1948 (10 jours après l'accouchement)

Examen clinique entièrement négatif.
TA 155-110 lors de l'entrée, baisse à 110-80 avec l'obligation du repos.
Bilan renal biologique normal.
ECG normal.
Fond d'oeil normal, pression artérielle retentie à 45 mm.
Urographie: montre l'existence d'un rein double à gauche. La séparation d'un rein par un autre par l'existence d'un angle.
Cold pressor test et test à l'effort négatifs.

2ème grossesse en 1950: Malade âgée de 24 ans suivie par le Dr. Bort

Durant toute la grossesse, la TA n'a jamais excédé 130-80 mmHg. On n'a observé d'albuminurie.

OBSERVATION NO. 18

1947

Prescription de la dose d'insuline normale de 120 unités
soit 120 unités d'insuline normale administrée à l'insuline
120 en administration à l'insuline par l'insuline
d'insuline de sources normales, restant en l'insuline à l'insuline
dans les 12 heures.

Nous avons reçu des nouvelles de cette femme en 1947.
A cette époque, âgée de 27 ans, elle est suivie régulièrement
par son médecin. Elle ne se plaint d'aucun trouble, sa TA
est de 120-80 et 120-80. Il n'y a plus jamais eu
d'insuline.

OBSERVATION NO. 19

T..... Jacqueline - 21 ans

ANTECEDENTS PERSONNELS:

3 mois: mastoïdite opérée

8 mois: Absces froids ganglionnaires

6 ans: invagination intestinale aigue opérée

9 ans: mastoïdite droite opérée

11 ans: séjour au préventorium d'un an pour "voile au poumon"

ANTECEDENTS FAMILIAUX:

Mère 39 ans dyséolique - serait soignée pour maladie de coeur.

1ère grossesse en 1947 - âgée de 20 ans

4ème mois: HTA à 180-7

5ème mois: découverte d'une albuminurie importante avec chylurie.

8ème mois: Crise d'éclampsie, TA 250-7

Accouchement prématuré d'une fille morte-née.

Après l'accouchement: examen clinique normal, pas d'albuminurie. TA 125-80.

2ème grossesse: compliquée (écouls 29 Octobre 1948).

Mars 49: TA 140-75

Mai 49: TA 145-80.

Examen clinique normal - TA 130-70

Laboratoire:

Albuminurie : 0

Van Slyke: Cs 56%

Om 62%

ED: normal PAR 45

UIV: hydronephrose bilatérale

CPT: positif montée de 125 à 180

Test à l'effort positif: montée de 125 à 150.

Traitement: repos, régime sans sel, distibère 5mg/jour.

Evolution:

Accouchement naturel à terme d'un enfant BP de 3500 grs.

Première 700 grs, état sans complications.

Recours de la mère à 105-70 quatre jours après l'accouchement.

ANALYSE
DES
OBSERVATIONS

CLINIQUE

Nos 16 malades ont été examinés. L'analyse objective de nos données permet de dégager dans l'ensemble une image clinique assez caractéristique.

ÉTAT GÉNÉRAL

L'état général de nos patients est satisfaisant. Les malades âgés de 20 ans et de 33 ans.

L'âge moyen de la population que nous examinons est de 26,9 ans. Les âges extrêmes sont de 20 ans et de 37 ans. À noter que les deux patients âgés de 20 ans, présentent des anomalies cardiaques importantes (une encore grave, l'autre moins grave) et que les deux patients âgés de 37 ans, présentent des anomalies cardiaques normales.

Il s'agit donc d'une population assez jeune, et c'est ce qui explique, en partie, l'absence de complications graves.

La période de conception la plus favorable, celle-ci
étant celle d'après Togo entre 20 et 25 ans.

Nous n'avons pas noté de type physique particulier
chez nos malades. Il a été signalé, en effet, que les hy-
pertensions de la grossesse surviennent plus spécialement
chez des sujets de taille courte et ayant une tendance à
l'obésité. Ce fait est d'ailleurs déjà bien connu.

Il n'y avait pas de grossesses gemellaires ou d'hydre-
mies dans notre série. Quant aux complications préexistantes
et familiales, nous y reviendrons à propos de l'étude patho-
génique.

12- DATE D'APPARITION ET DURÉE DES SYMPTÔMES

Il est assez rare de voir la grossesse l'inciter à l'acte
les yeux étant il est difficile de leur rendre compte. A quelques
exceptions près, il survient sans la moindre cause et
sans pas de renseignements sur la grossesse à propos
desquelles nous ne savons rien quant à la date de survenue
des troubles. Nous voyons que cette prédominance pour la
apparition tardive des complications. Au cours de la
grossesse nous voyons que les troubles surviennent 12 fois
12 fois pendant le deuxième trimestre, 2 fois pendant le
premier trimestre, et deux fois lors de l'accouchement.
Mais il nous faut faire des réserves quant à la surveil-
lance dont ces malades ont été l'objet. Il est fort pos-
sible que nous n'ayons pas vu tous les troubles qui se sont
produits au cours de la grossesse. Les troubles surviennent

leur Vallery Radet alors que les troubles étaient déjà
apparus du lieu pour un bûche à la suite de l'accouchement.

Il est intéressant de noter que dans un certain nombre
de cas, les troubles sont apparus avant l'accouchement et
ont persisté après celui-ci. Les premiers signes sont pour
tous collectifs et se caractérisent par une fièvre élevée
et des douleurs articulaires. Les premiers signes sont le 2ème
trimestre au stade de la grossesse chez la femme No. 10.
ou dans les premiers jours de la grossesse No. 12.

Il faut signaler que les troubles ne sont pas
toujours accompagnés de douleurs articulaires. Les premiers
signes sont le 2ème trimestre de la grossesse chez la femme
No. 10. ou dans les premiers jours de la grossesse No. 12.

Les troubles sont accompagnés de douleurs articulaires
et de fièvre élevée. Les premiers signes sont le 2ème
trimestre de la grossesse chez la femme No. 10. ou dans
les premiers jours de la grossesse No. 12. Les troubles
sont accompagnés de douleurs articulaires et de fièvre élevée.
Les premiers signes sont le 2ème trimestre de la grossesse
chez la femme No. 10. ou dans les premiers jours de la
grossesse No. 12. Les troubles sont accompagnés de douleurs
articulaires et de fièvre élevée. Les premiers signes sont
le 2ème trimestre de la grossesse chez la femme No. 10.
ou dans les premiers jours de la grossesse No. 12. Les
troubles sont accompagnés de douleurs articulaires et de
fièvre élevée. Les premiers signes sont le 2ème trimestre
de la grossesse chez la femme No. 10. ou dans les premiers
jours de la grossesse No. 12. Les troubles sont accompagnés
de douleurs articulaires et de fièvre élevée. Les premiers
signes sont le 2ème trimestre de la grossesse chez la femme
No. 10. ou dans les premiers jours de la grossesse No. 12.

La nature de ces signes révélateurs est diverse; leur association est également variable. Dans 27 cas, c'est l'hypertension artérielle qui a donné l'alarme, dans 22 cas l'œdème, dans 9 cas l'albuminurie. Deux fois, il s'est agi de signes fonctionnels mineurs, une fois de paresthésies et 2 fois d'éclampsie. La découverte d'un seul de ces signes au cours de la gestation doit donc faire rechercher les autres et entraîner une surveillance rigoureuse de la patiente.

III- TABLEAU CLINIQUE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE GRAVIDIQUE RECIDIVANTE.

Il n'est guère possible de donner une succession précise aux divers signes. L'ordre dans lequel nous les étudierons est arbitraire et ne représente pas une donnée chronologique.

A) L'hypertension artérielle:

C'est elle qui a été la plus souvent retrouvée (19 cas). Si l'on se souvient que dans la grossesse normale, le chiffre tensionnel est abaissé au cours du 2^e trimestre au-dessous de son taux habituel, il semble valable de prendre comme limite supérieure de la normale 140-90 (même que certains auteurs ont préféré des chiffres plus élevés: 160-90). Cependant, comme le remarque très justement Dieckmann, il y a lieu de prendre

la surveillance de l'âge et le poids de la patiente.

Il faudrait une grande attention à la surveillance artérielle des femmes âgées de 40 ans, la grossesse avoir comme référence une prise de tension artérielle normale antérieure à la première grossesse. Ceci est habituellement exceptionnellement le cas. D'autre part, l'existence d'une hypertension artérielle découverte après 5 ou 6 grossesses normales peut être considérée par certains comme une décharge des performances sévères pendant les grossesses encore que cela soit discuté comme pour le verrou. C'est donc le retour à la normale de la tension artérielle dans l'intergrosesse qui permet de 2 ou 3 premières grossesses s'accompagnant d'hypertension qui permet d'affirmer que les lésions étaient liées à l'âge.

Le "card presser" est l'élément de diagnostic de l'hypertension artérielle permanente ou passagère. Nous l'avons pratiqué chez un certain nombre de ces malades. Sur les 9 fois où il a été fait au début de la grossesse, il se révèle 6 fois négatif et 3 fois positif. Trois fois pratiqué pendant une grossesse avec hypertension, il donne des résultats négatifs dans 2 cas et positif dans un cas. Ces résultats ne sont pas très différents de ceux que nous avons obtenus par d'autres méthodes. On peut donc conclure que la surveillance de la tension artérielle est un élément de diagnostic de l'hypertension artérielle.

L'importance de l'hypertension artérielle semble dans une certaine mesure en relation avec la gravité des troubles neurologiques. En effet, sur 5 malades d'épilepsie dont la tension artérielle était connue au moment du début de la crise, 3 avaient une tension au début de 200 (maximum à 220) mm Hg, une seule avait une tension au début de 180 (maximum à 220) mm Hg, une seule avait une tension au début de 160 (maximum à 220) mm Hg. Cependant une période a fait successivement une crise de l'épilepsie et 2 crises partielles malgré une tension artérielle dont le maximum n'a pas dépassé 165.

Les relations de ces accidents neurologiques avec l'importance de l'hypertension artérielle évoquent au premier chef le tableau de l'hypertension pseudo-tumorale où les manifestations neurologiques tiennent le devant de la scène.

B) 1° phase

Il a été relevé dans 45 de nos cas, soit sous forme mineure, soit de façon plus importante.

C'est Zangmeister, et Milliez en France qui ont mis l'accent sur l'importance de son début précoce par des pesées régulières des femmes enceintes. En effet, bien avant qu'il ne se pose cette question de la surcharge hydro-chlorure, il est de l'ordre de 100 g par jour.

par une prise de poids exagérée: 100 grs par semaine. Telle est la limite de poids que Millier et bien des auteurs étrangers après lui accordent au cours d'une grossesse. Bien entendu, il s'agit là d'une limite arbitraire, dépendant du poids initial de la malade et de l'âge de la gestation (prise de poids plus rapide au cours des derniers mois). Cependant, tout en accordant une valeur considérable à ce critère, il est indispensable de se laisser une certaine latitude. Nous y reviendrons.

La localisation de cet œdème a également une importance: il est fréquent au cours de la grossesse normale de constater l'existence d'un léger gonflement des membres inférieurs. Ceci s'explique aisément du fait de l'hyperension veineuse des membres inférieurs constatée au cours de toute grossesse. Par contre, l'existence d'un œdème de la face ou des mains (signe de la bague) a une valeur beaucoup plus réelle, témoignant directement de la rétention hydro-saturée sans qu'entre en jeu une hyperpression veineuse. Cet auteur pense d'ailleurs que l'œdème est souvent absent ou du moins minime dans les HGR. Ceci semble confirmé dans notre série où seuls le moins souvent retrouvés ces trois grands signes cliniques, et toujours de façon modérée.

C) L'Albuminurie

C'est la dernière grandeur que nous allons étudier.

et c'est lui qui a été le premier reconnu par les auteurs. Sa découverte est à l'origine de la théorie renale de l'hypertension gravidique, qui a longtemps prévalu.

Nous l'avons retrouvé 30 fois chez nos malades, isolé ou associé à d'autres symptômes, à l'état de trace ou au contraire atteignant plusieurs grammes par jour. Il ne semble pas que l'on puisse établir une corrélation quelconque entre l'importance de l'albuminurie et la gravité du syndrome. Disons seulement qu'il est habituel de retrouver une albuminurie importante lorsque l'on est en présence d'une toxémie sévère avec hypertension artérielle élevée. L'albuminurie a peut-être perdu de sa valeur au point de vue pronostic, étant le témoin de l'affection plus qu'un élément étiologique.

D) Les accidents neurologiques

Ainsi que nous l'avons dit, ils représentent une conséquence des troubles cardiovasculaires, la toxémie plutôt qu'une manifestation spécifique de celle-ci. Ce sont eux qui font toute la gravité du pronostic maternel immédiat.

1) La céphalée - Nous ne l'avons constatée que 2 fois. Sans gravité par elle-même, elle doit être considérée comme un signe d'alarme pouvant précéder aux accidents plus graves que nous signalons.

2) Cécité - Nous n'en avons constaté aucune dans cette série et l'on ne doit pas la confondre avec la cécité totale No. 2. Il était dû à une crise transitoire avec anurie et azotémie transitoire.

3) Troubles oculaires - Nous avons observé une baisse de l'acuité visuelle et une amaurose. Ces accidents étaient transitoires et accompagnés dans le premier cas un diplopie parétic, et dans le second une crise d'éclampsie.

Chez ces deux malades, l'examen du fond d'oeil pratiqué après l'arrêt des crises épileptiques a permis de constater une atrophie des papilles et une diminution de la vision des couleurs. Il n'y avait pas de troubles de la vision des couleurs, mais régressifs et plus particulièrement de la vision des couleurs comme en témoigne l'intégrité du FO. Il s'agit d'une amaurose corticale.

4) Les accidents paralytiques - Une de nos malades a présenté à deux reprises des accidents paralytiques (malade No. 10). Le premier était une hémiparésie du membre supérieur droit, accompagnée d'une diminution de l'acuité visuelle qui disparut sans sequelles. L'autre consistait en une hémiparésie gauche avec paralysie faciale importante. L'évolution de cette hémiparésie a été incomplètement régressive. Ces deux accidents sont survenus au cours de deux grossesses successives mais, fait particulier, ne s'accompagnent pas de poussées épileptiques importantes.

5) Les accidents convulsifs - Nous avons observé

Chez 7 autres malades ayant fait des poussées tensionnelles, nous n'avons pas constaté de crises épileptiques dans aucun cas d'accidents semblables. Force nous est donc d'attribuer à cette maladie une prédisposition particulière aux accidents neurologiques de ce type.

5) Les crises épileptiques réalisent au point de vue clinique l'aspect de crises épileptiques banales (que nous nous abstiendrons de décrire). Nous en avons constaté 7 cas dans nos observations. Elles se divisent en 4 types d'élancements selon leur date d'apparition: *inter-partum*, précédant de peu l'accouchement; *intra-partum*, survenant pendant l'accouchement; *post-partum*, précédant de quelques jours l'accouchement, et *post partum*. Nos cas se rangent pour deux d'entre eux dans les intercurrents, et pour deux dans les *inter* ou *intra-partum*. (Il est souvent difficile de bien préciser aux malades s'il s'est écoulé un temps de latence entre la crise et l'accouchement). L'on voit la gravité pronostique de l'éclampsie conventionnelle tant pour la mère que pour l'enfant. Dans notre étude nous n'avons pas eu à déplorer de mort maternelle, par contre notre bilan total s'est avéré catastrophique: sur 7 malades s'étant présentées, 1 est décédée, une autre a eu un avortement et la dernière est restée en observation.

capitale de soins pré-nataux diligents - soulève par
tous les auteurs d'accord à dire que si elle n'est pas
fait à l'occasion de la fréquence de l'hypertension gravidique,
ils en ont considérablement atténué la gravité, en par-
ticulier en ce qui concerne la fréquence des accidents
scolopiques, qui grèvent le plus lourdement l'évolution
de la toxémie dans l'immédiat. Ainsi, sur nos 6 patientes
ayant fait des crises d'éclampsie, dans 3 cas celles-ci
sont apparues lors de la première grossesse alors qu'une
surveillance stricte n'avait pu être exercée.
Des malades n'ont présenté de crises épileptiques pendant
aucune de leur grossesse ultérieure. Une autre malade
a fait une crise d'éclampsie lors de sa deuxième gesta-
tion mais la première s'était terminée par un avortement
et ce cas se ramène aux précédents. Enfin, la dernière
malade a été atteinte lors de son 4ème accouchement, mais
il n'y avait pas eu de signes de toxémie lors des grossès-
ses précédentes. Pourtant, elle a recommencé à faire
des crises lors de sa 5ème grossesse. Cette dernière
a été suivie d'une surveillance stricte. Ainsi, dans tous
les cas, l'on peut supposer qu'une attention plus
soignée aurait pu éviter les crises épileptiques.

En conclusion de cette étude des accidents neurolo-
giques au cours des hypertension artérielles gravidiques
récurrentes, un fait semble saillant: c'est à part les

accidents du type paralytique, comme des convulsions, quelque soit leur caractère épileptique, sont essentiellement transitoires. Tout autre épisode plus grave, par le fait même de leur état, ne peut laisser que la disparition complète et sans sequelles. Il est très probable qu'il s'agit, comme les très rares cas cités, des conséquences d'une poussée d'une épilepsie qui agit plus à son élévation brusque, provoquant une ou deux crises épileptiques, suivies d'un état comateux préparé par la rétention urinaire. Les accidents épileptiques, autres que les crises épileptiques, disparaissent à leur tour.

IV - LES EXAMENS DE COMPLEMENT

A) Le bilan renal

Celui-ci consistait habituellement en une série d'examens comportant:

Examen d'urine au microscope et examen chimique.

Numération des hématies et leucocytes/mi.

Etude du sédiment urinaire et uroculture.

Clearance de l'urée selon la méthode de Van Slyke.

Epreuve à la phénol-sulfo-phthaléine.

Dans quelques cas ont été pratiqués également une étude de la clearance au mannitol et à l'acide para-aminohippurique.

Ce bilan a été pratiqué chez 8 patients atteints de néphropathie chronique avec signes de compression de la moelle.

Il faut nous en tenir à cette étude en dehors de la grossesse. Dans 7 cas, les résultats étaient absolument normaux, 5 fois il existait de discrètes perturbations en particulier de la clearance urinaire qui se révélait à la limite inférieure de la normale. Une seule fois, les épreuves étaient franchement perturbées, mais il s'agissait d'une malade (obs. No. 2) qui nous était adressée à la suite d'une anurie aiguë survenue après un grand choc hémorragique du post-partum. Malgré l'amélioration clinique, la malade était dans des épreuves rénales encore très anormales. Après 2 ans après, les clearances du mannitol se trouvaient à la limite inférieure normale. Il est évident que l'on ne peut incriminer dans ce cas la toxicité grave et que la rôle de l'anurie post-hémorragique n'est certainement pas négligeable.

Il semble donc, que dans l'ensemble, on ne puisse attribuer à l'existence de troubles rénaux des épreuves rénales. Même à part la dernière malade, les perturbations étaient très discrètes ou inexistantes. En tous cas, aucune altération spécifique des HRP n'a été mise en évidence.

Cette observation est confirmée par les données par nous même faite chez 10 malades (obs. Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

complications des lésions de la gestation, il était absolument normal, au contraire une élévation considérable de la tension au cours de la grossesse. Tous les autres avaient une tension normale. Dans un cas, nous avons constaté une hydro-néphrose droite au cours plus importante qu'on ne le voit habituellement au cours de la grossesse normale. Le reste des cas présentait une hypertension bilatérale. Dans un cas, nous avons constaté de graves modifications de la circulation.

Là encore, pas d'anomalie marquée ou constante permettant d'établir une image en fait de l'hypertension gravidique récurrente. Nous ne l'excluons donc dans ces cas d'anomalies rénales concomitantes et dans deux autres cas d'hydro-néphrose : nous y reviendrons à l'étude pathogénique.

B) L'examen du fond d'œil

Pratiqué 4 fois en cours de grossesse avec signes de toxémie, il a été trouvé normal dans tous les cas. Nous avons fait examiner le fond d'œil 12 fois à distance d'une gestation; dans il cas il n'existait aucune modification, une fois seulement on constatait un léger flou de la papille deux mois après un accouchement, au 7ème mois d'une grossesse normale.

C) Electrocardiogramme

Il a été fait 10 fois.

seul. Un seul montrait un discret axe gauche.

D) Dosages hormonaux

Malheureusement nous n'avons pu les pratiquer bien souvent. Comme nous l'avons déjà dit, la plupart des malades nous sont adressés après l'accouchement pour un bilan; d'autre part certains des cas que nous avons vus en état de grossesse sont antérieurs à l'époque où il nous était aisé de faire pratiquer ces dosages.

Dans un cas, nous avons constaté une baisse du prégnandiol et de la folliculine dans les urines au-dessous du taux normal; une malade avait des éliminations hormonales entièrement normales; chez une malade enfin, nous n'avons pu pratiquer qu'un dosage des androgènes et des stéroïdes du type glucocorticoïdes qui se sont révélés normaux.

Il est évidemment impossible de conclure.

E) Le placenta

Sur les 66 grossesses, nous avons eu 13 fois des renseignements sur l'état du placenta ou bien nous avons pu demander qu'il soit examiné. 4 animaux dont 11 up semblaient normaux. Tous les autres présentaient des lésions diverses: 5 fois il y avait un hématome rétro-placentaire, 2 fois il était porteur d'infarctus hémiques, une fois il existait un ectyleon séreux, une fois il existait des lésions microscopiques des parois amniotiques et chorioniques.

... cette foetus est spécialement touchée de la gravité de la toxémie, celle-ci répondant à un état de grande partie de la vieillesse et de la qualité du travail.

Enfin, la tendance à la débilité et à la petite taille observées par de nombreux auteurs est confirmée par nos cas, puisque la moyenne, pour 26 foetus dont nous connaissons le poids, s'établit à 2.240 grs.

Les proportions doivent être étudiées sous deux aspects, immédiat et lointain.

1) Pronostic immédiat

Nous n'avons eu à déplorer aucun cas de mort chez les malades qui ont fait des crises d'éclampsie. Cependant notre série est évidemment très restreinte. L'éclampsie est le grand facteur de décès maternel, surtout aux débuts de la grossesse. L'OMS déclare 21% de mortalité dans l'éclampsie ante-partum, 10% dans l'éclampsie post-partum. Page, un peu plus optimiste donne un chiffre global de 10% de mortalité pour l'éclampsie.

Les causes directes de la mort sont, au premier chef, l'œdème aigu pulmonaire, le choc, l'hémorragie cérébrale, plus rarement des lésions de l'utérus ou du placenta. La grossesse compliquée d'éclampsie est une

Le tubule terminal ne subissant pas modifications de la circulation gravidique et sont placés en relation avec le décollement prématuré du placenta (page).

2) La grossesse lointaine est beaucoup plus difficile à dégager et a été l'objet d'études et de discussion sans nombre.

Parmi nos 19 malades, 15 ne présentaient aucune lésion apparente, 4 étaient marquées par de discrètes lésions rénales, une seule gardait des lésions rénales importantes (cette il s'agit de la patiente qui avait fait une anurie post-hémorragique). Disons tout de suite d'ailleurs qu'il s'agit là d'une série trop courte pour se faire une opinion nette et que le recul de temps n'est pas suffisant.

En fait, 2 courants d'opinion s'affrontent:

Pour les uns, les deux peuvent laisser des séquelles rénales ou hypertensives.

Pour les autres, il n'y a pas de séquelles propres à la toxémie. Les altérations qui peuvent lui survivre sont la conséquence d'une tare latente pré-existante.

Les auteurs les plus pessimistes sont de loin Danks qui, sur 102 patientes nées de 6 mois à 12 ans après la dernière grossesse compliquée de toxémie, a constaté 100 cas de lésions rénales.

Salazar et 200 autres auteurs.

Durant et 1960, Salazar, les résultats des 500 cas purement toxiques ont été analysés et ont montré que 10% d'entre eux ont eu une hypertension résiduelle, 22% d'entre eux ont eu une hypertension résiduelle associée à une albuminurie, et 18% d'entre eux ont eu une hypertension résiduelle permanente. Une hypertension artérielle s'est installée de façon tardive. Dans 18% des cas, il y a eu aggravation progressive au cours de grossesses anormales répétées. Enfin, pour 22% d'entre eux, le silence fut comblé entre la grossesse et l'apparition de l'hypertension artérielle. Les auteurs concluent que chez ces femmes ayant présenté une pré-éclampsie, la pierre de touche de la guérison complète est la façon dont est tolérée une grossesse ultérieure.

Tillman, sur 51 malades ayant fait une crise d'éclampsie constate 34% d'hypertension dans les années qui suivent.

Ravault, Font et Chartagnon, dans une autre publication portant sur 30 cas de toxémie pure, notent 34% d'hypertension résiduelle, 29% d'albuminurie associée à une hypertension, et 18% d'hypertension permanente après gravidoparité résiduelle.

Bryans et Torpin citent 22% d'hypertension post-toxémique sur une série de 100 cas. Ils constatent que la

pourcentage d'hypertension augmente avec l'âge lors du nouvel examen.

Pigeaud, Dumont et Ohryss donnent 70% comme proportion d'hypertension persistante survenant après la toxémie gravidique.

Enfin, si l'on se souvient que 75 d'hypertension persistante survient post-éclampsie-éclampsie, fait particulier, la fréquence est plus grande dans les toxémies graves sans éclampsie (11,1 %) que dans les cas sans éclampsie (5,5 %) et dans les toxémies légères (2,2 %) nous reviendrons sur ce fait.

Enfin d'après ces statistiques conclut qu'il ne peut exclure la possibilité de sequelles après toxémie, mais que celles-ci restent rares.

Enfin Page, sans citer de chiffres, déclare que les toxémies gravidiques peuvent créer des lésions rénales irréductibles.

Tous les auteurs qui défendent ce point de vue accordent une certaine valeur pour la prévision des sequelles à des chiffres assez précis :

- pour beaucoup, l'âge de la femme lors de la grossesse est d'importance capitale. L'hypertension survient d'autant plus fréquente que le nombre est élevé.

- la gravité des symptômes, ceux-ci ayant une importance

plus grande que celle des chiffres.

Le premier est la question de la forme
de la langue.

Il y a deux manières de poser la question.

La première est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La seconde est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La troisième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La quatrième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La cinquième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La sixième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La septième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La huitième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La neuvième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La dixième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La onzième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La douzième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La treizième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La quatorzième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La quinzième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La seizième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La dix-septième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La dix-huitième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

La dix-neuvième est de se demander si la langue
est une ou plusieurs.

s'élevant pendant plusieurs semaines est beaucoup plus apte à laisser des sequelles qu'un accident épileptique brutal mais sans lendemain.

- La répétition des gestations anormales est pour beaucoup un facteur aggravant. L'espacement de ces grossesses joue également un rôle pour certains. Les sequelles sont d'autant plus fréquentes que l'intervalle séparant les gestations est plus long.

Contre cette attitude passiviste visant à éléver des études tendant à prouver que la toxémie gravidique est dépourvue de sequelles réelles et hypertensives.

Dr Burck et Basse se bornent à déclarer sur la foi de leurs travaux au cours des 15 dernières années qu'ils ne peuvent que recommander qu'on laisse derrière elle des séquelles réelles. A d'autres auteurs on tient sur des données statistiques qui constituent un faisceau impressionnant.

L'étude la plus exhaustive sur celle de Theobald qui a étudié les registres d'état civil de Grande Bretagne et rapporté une épidémiologie portant sur 50 millions de décès chez les femmes. La différence entre les femmes mariées et célibataires quant au nombre de décès par maladie chronique n'est pas significative. La mortalité est de 1000 sur 100000 pour les mariées et de 1200 sur 100000 pour les célibataires.

est plus fréquente chez les épileptiques. La balance de la mortalité, la création de centres de soins pré-natal a fait décroître le nombre global des hypertension gravidiques, mais non celui des néphrites chroniques. Il conduit à l'absence de relations de cause à effet entre toxémie et néphrite chronique. Barnes et Brown ont fait une étude portant statistique comparant la tension artérielle chez 515 nullipares et 1.041 femmes ayant des enfants. Ils ne trouvent pas de différence dans les groupes d'âge correspondant. L'hypertension est progressive avec l'âge mais sans rapport avec l'existence ou le nombre des gestations. Le processus d'hypertension par le nombre des hypertensions et la prévalence d'apparition. Ils concluent de leur étude que la toxémie est un état transitoire, se liant avec des lésions vasculaires définitives.

Bell et Yell, travaillant avec 4 ans de recul leurs malades ayant présenté une pré-éclampsie-éclampsie trouvent chez elles 10,3 % d'hypertension, soit un chiffre moindre que chez un groupe témoin n'ayant pas eu de grossesse normale. Ils pensent que la toxémie chez une malade non toxique est exceptionnellement à l'origine d'une hypertension chronique.

Blanchard, en 1934, a fait une étude portant sur 100 femmes souffrant de pré-éclampsie-éclampsie. Il trouve chez elles 10,3 % d'hypertension, soit un chiffre moindre que chez un groupe témoin n'ayant pas eu de grossesse normale. Il conclut que la toxémie est un état transitoire, se liant avec des lésions vasculaires définitives.

est donc l'élément principal de la formation
de la langue. Les autres éléments de la langue
sont : le son, le mot, la phrase, le
discours. Le son est l'élément de la
langue qui se compose de l'articulation
des sons. Le mot est l'élément de la
langue qui se compose de l'articulation
des sons. La phrase est l'élément de la
langue qui se compose de l'articulation
des sons. Le discours est l'élément de la
langue qui se compose de l'articulation
des sons.

grossesse se ne se trouve jamais comme laquelle de pré-
-solampais-solampais. De plus, les autres types d'
affection rénale ont, souvent pour origine une pré-
-solampais-solampais." En fait, nos attitudes ont un peu
particulière du fait de la détection de la toxémie
pure: pour lui, tout syndrome hypertensif de la gros-
sesse se prolongeant au-delà de 3 semaines représente
une hypertension artérielle permanente aggravée et non
une dyagravidie pure.

Que penser de cette série d'études statistiques
fautes par des auteurs également dépourvus de foi et sans
documentaire? Nous ne pouvons pas donner une opinion
personnelle, parmi les arguments en faveur de l'absence
partielle. Il nous semble que les arguments statistiques
des tenants de l'intégrité rénale et vasculaire après
toxicité gravidique sont plus précis et plus en accord
avec la réalité de la pathologie de l'affection rénale
que nous les révoquons. Mais les divergences sont
certainement liées aux difficultés que rencontre l'
établissement d'un diagnostic précis entre les divers
types de néphropathies gravidiques et la faiblesse
des critères qui président à cette différenciation.

Il est évident que les données relatives à la
pathologie rénale pendant la grossesse sont encore

ces frégates avaient dans leurs soutes un lot important de caisses jamaïques d'une saveur antérieure (hyperémie ou affection rénale). Cette tare complètement léthale en dehors des grossesses d'extériorité pendant lequel. Plus étonnant, elle se manifestait même elle l'avait fait même en l'absence de gestation. Au contraire, dans les études plus ophtalmiques ou de qui concernent le processus local externe, il y avait probablement une majorité de cas où les troubles disparaissaient avec la gestation.

Il reste qu'un certain nombre de la vulnérabilité pour le processus local; la durée de la toxicité de l'œuf dépendait des conditions locales ou systémiques même mineurs et les symptômes persistaient dans une certaine mesure si elle était prolongée.

C'est donc l'importance du problème diagnostique que nous devons maintenant étudier.

DIAGNOSTIC DE L'AVERTISSEMENT

Le syndrome de GEM survient chez des personnes à l'âge moyen de la vieillesse sans qu'il soit possible de type particulier de diagnostic (d'origine génétique d'une maladie de l'oreille ou d'une maladie (qualité hydraulique)).

Les premiers signes apparaissent le plus souvent tardivement, dans le dernier trimestre de la vieillesse mais il n'est pas exceptionnel de les voir survenir dès le deuxième trimestre. Ils se reproduisent souvent à la même époque de la vieillesse pour chaque malade: nous n'avons pas noté d'apparition plus précoce au cours de la vieillesse ou plus tardive au cours de la vieillesse.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE

Le développement de la culture est un processus complexe qui implique de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer l'éducation, l'économie, la politique, la religion, etc. Ces différents facteurs interagissent les uns avec les autres pour déterminer le niveau de développement d'une culture.

Les progrès de la culture sont souvent mesurés en fonction de la production artistique, scientifique et technique. Cependant, il est important de ne pas se limiter à ces seuls critères. La culture est avant tout un mode de vie, un ensemble de valeurs et de traditions qui donnent sens à l'existence humaine. Le développement de la culture doit donc viser à améliorer la qualité de la vie et à promouvoir le bien-être de tous.

Il est fait de la réunion de trois signes : hypertension artérielle, odème et altération, qui peuvent s'associer de façon diverse, certaines pouvant manquer. Il peut ou non se compliquer d'écoulements urinaires transitoires, mais presque la plus souvent de l'écoulement cérébral.

Les données de laboratoire sont pauvres et le bilan cardio-vasculaire, rénal et oculaire reste le plus souvent négatif.

Si le pronostic initial est assez réservé, le pronostic ultérieur peut être plus favorable quand il survient des complications.

Enfin, la présence de lésions pathologiques dans un élément quasi-constante.

Ces données vont-elles nous permettre de différencier le syndrome de CA des autres troubles survenant au cours de la grossesse ?

I- Grossesse normale

Il peut paraître étrange de poser un problème de diagnostic entre grossesse normale et toxémique. Cependant, il s'agit d'un problème sérieux de l'affection et en particulier de la question de savoir si la présence d'un certain nombre de symptômes suffit à poser le diagnostic de toxémie. Il est donc de savoir si l'on

Il est fait de la réunion de trois algues. L'une est verte, l'autre brune, et la troisième est rouge. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues.

Les algues sont très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues.

Si la plante est très commune dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues.

Les algues sont très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues.

Ces algues sont très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues.

Les algues

Il y a trois espèces de algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues. Elles sont toutes trois très communes dans les rochers et les algues.

chance d'aggravation chez les malades atteints de maladie de Addison. Il semble qu'il s'agit de "pseudo-pre-éclampsie" pour laquelle il n'est pas nécessaire d'appliquer une restriction saline.

Ce test est très intéressant, mais les dangers que représentent les surcharges salines chez une malade en état de toxémie restreint son usage dans la pratique courante.

Cette rétention hydro-chlorurée se traduit au clinique par la prise de poids exagérée des malades atteintes d'EGR.

II- Toxémie pure sans accouche ni récidive

Le tableau clinique de cette toxémie est exactement identique à celui de l'EGR. Ainsi lorsqu'on est en présence d'une primipare en état de dysgravida, est-il possible de prévoir l'évolution des grossesses ultérieures?

Le terrain de la toxémie pure sans lésion pré-sente quelques particularités. Il s'agit le plus souvent de primipares très jeunes, puisque les études de Dickman font état d'une majorité de patientes entre 15 et 19 ans. Rappelons cependant que 3 de nos cas étaient âgées de 20 ans lors de la première grossesse toxémique ce qui ne les a pas empêchées de faire de nouvelles accouchements ultérieurement.

L'influence de la taille de produit de conception

est donnée de tous. Gros cœur, géminité, hydramnios sont des facteurs prédisposants certains. Bien évidemment, on ne peut arguer de telles notions pour prédire l'avenir des gestations successives.

Si bien que lorsque l'on voit le malade lors de sa première grossesse, force est de recourir aux statistiques pour avoir une idée de l'évolution. Celles-ci donnent entre 20 et 35% de récidives après une grossesse anormale.

Lorsque deux grossesses ont été perturbées il est très probable que les suivantes le seront également et ce d'autant plus que les grossesses se répètent. Une de nos malades a pourtant fait après deux grossesses anormales, 2 grossesses normales séparées par un avortement ; mais elle avait été maintenue à un régime désoxypréventif pendant ses deux grossesses.

La conclusion doit donc être une attitude de vigilance particulière chez toute femme enceinte ayant une dysménorrhée dans ses antécédents.

III- Les accidents de gestation en cours de l'hypertension artérielle permanente

Il convient tout d'abord de régler une question de sémantique. Pour certains auteurs (Foucal, Page) ces accidents sont le fait d'une toxémie surajoutée et

conséquences du terrain laré. Pour d'autres (Dieckman) il n'y a jamais de toxémie surajoutée mais une aggravation transitoire ou permanente de l'hypertension artérielle pré-existante. Sans prendre parti, nous nous bornerons à rappeler que les manifestations cliniques les complications neurologiques, les dangers auxquels sont exposés le mère et le fœtus au cours des deux affections sont semblables sinon identiques et les indications thérapeutiques analogues. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la difficulté du diagnostic différentiel. C'est là aussi toute, une différence de point de vue plutôt qu'une différence de fait.

Il n'existe que deux critères de différenciation absolus entre HM et hypertension artérielle permanente aggravée par la gestation: c'est la notion d'une prise de tension normale avant toute gestation et le retour à une stricte normale des chiffres tensionnels entre les grossesses successives. En fait, le premier manque presque toujours; quant au second, il est de ces cas d'hypertension permanente latente où les chiffres tensionnels peuvent revenir à la normale entre les gestations et l'attribution au premier ou au second est beaucoup plus tard.

La fréquence des complications artérielles au cours de la grossesse est variable et dépend de divers facteurs

ment appréciée. de 70% de complications dans une étude de Kologlu portant sur 255 cas, nous la voyons tomber à 50% pour Milliez, 34% pour Page, 18% pour Browne et Dodds. Sharkey et Hess n'ont observé, chez 115 hypertendues enceintes, qu'une élévation modérée de la tension artérielle sans autre manifestation. Ces divergences de vue tiennent probablement à des critères différents exigés par ces auteurs pour parler des complications.

Le tableau clinique est le même que dans les HGR. Cependant, quelques nuances l'en distinguent. Il s'agit de malades plus âgées, souvent de plus de 30 ans. Le début des troubles est plus précoce, se faisant le plus souvent au deuxième trimestre de la grossesse et nous avons vu qu'une tension dont les chiffres atteignent 140-90 dans les premiers mois doit faire évoquer le diagnostic, compte tenu de l'abaissement tensionnel habituel au début de toute grossesse normale. Ce sont là des arguments bien faibles et nous voyons parmi nos cas d'HGR qu'une malade a fait sa première grossesse toxique à l'âge de 17 ans, tandis que chez la d'entre elles, les troubles sont apparus pendant les deux premiers trimestres.

Le syndrome initial, il y a eu un prédominance des manifestations focales de l'hypertension sur l'œdème et l'albuminurie, réalisant souvent un tableau d'hypertension toxique.

La fragilité de ces éléments explique la multitude des épreuves cliniques et para-cliniques visant à différencier les deux syndromes. Finckley insiste beaucoup sur la valeur de l'examen du fond d'oeil. Alors que dans les hypertension artérielles permanentes, il trouve des signes de rétinopathie hypertensive dans un stade variable, la toxémie est caractérisée pour lui par une brillance du fond d'oeil et de la rétine. Il attribue à ce signe une valeur diagnostique lui permettant de prévoir le développement des complications cliniques.

Il a déjà parlé de l'apport de surcharge chlorurée au cours de l'éclampsie. Mais dans l'hypertension permanente, l'administration orale de NaCl est nettement abaissée dans les HGR.

Il a également proposé un test par injection d'un vasodilatateur agissant par inhibition des fibres sympathiques, la nifédipine. L'injection de ce produit entraîne une chute tensionnelle chez les hypertendus permanents, même si le produit ne provoque pas de chute de la tension. Ce test est effectué parallèlement à la mesure de la tension.

Toutes ces épreuves ont une valeur diagnostique, ou bien de réalisation difficile, ou bien de réalisation dangereuse. La mesure de la tension reste la méthode de référence.

la culture de ces plantes est très importante
pour la production de la laine et de la viande.
Les éleveurs ont donc beaucoup de mal à faire
croître ces animaux dans les régions arides.
C'est pourquoi ils ont dû chercher à améliorer
les conditions de leur élevage. Ils ont ainsi
mis au point des méthodes de culture qui leur
permettent de produire plus facilement et plus
rapidement. Ces méthodes sont basées sur l'utilisation
de produits chimiques et de produits naturels.

Mais cette culture de l'élevage de moutons
est très difficile. Les moutons ont besoin
d'un terrain très fertile. Ils ont aussi besoin
d'un climat très chaud. C'est pourquoi ils
ont dû chercher à améliorer les conditions
de leur élevage.

Aussi on les emploie souvent en tant que
injection d'un médicament spécial par injection
des tubes élastiques. La teneur en eau est
inférieure de ce produit spécial. Les conditions
chez les éleveurs sont très difficiles. Ils ont
beaucoup de mal à faire croître ces animaux.
C'est pourquoi ils ont dû chercher à améliorer
les conditions de leur élevage.

Tous les éleveurs ont donc dû chercher à
améliorer les conditions de leur élevage. Ils
ont ainsi mis au point des méthodes de culture
qui leur permettent de produire plus facilement
et plus rapidement.

aucune d'entre elles ne soit passée dans la pratique courante. La plupart du temps, l'on est contraint d'attendre la fin de la grossesse avant de savoir si l'on est en présence d'une affection permanente ou occasionnelle, par un bilan complet à distance de la gestation.

IV- Les accidents de la gestation survenant sur une néphropathie pré-existante

Ils sont dans l'ensemble assez rares. Fritel, dans une statistique portant sur 173 malades ne trouve que 10% de néphropathies pré-existantes, se répartissant ainsi: 14 néphrites aiguës, 2 néphroses lipidiques, une polykystose rénale, 3 pyéloéphrites atrophiques.

La variabilité de l'apparition de l'hypertension gravidique en cours des affections rénales a fait dire à Adin: " la grossesse peut se dérouler sans aggravation et n'être pas compliquée par une lésion rénale pré-existante, ou bien représenter une catastrophe."

Ce tableau aléatoire n'est guère différent de celui des HGR, sauf que le début des troubles est peut-être plus précocé. C'est la notion des antécédents et la découverte de modifications importantes des épreuves rénales pendant après l'accouchement qui fait poser le diagnostic.

Tous les auteurs s'accordent sur le rôle primordial de l'hypertension dans la gestation sur antécédents

... ..

Ainsi Miller insiste sur le pronostic bien meilleur des néphrites chroniques non hypertensives par rapport aux néphrites hypertensives.

Les anomalies rénales congénitales sont moins rares qu'on ne pourrait le croire. Ainsi, Fritel pratiquant des urogrammes systématiques chez 55 malades ayant eu une toxémie a trouvé ces anomalies dans 17 cas. Il est probable qu'elles agissent pas directement par elles-mêmes mais en favorisant le survenue de pyélonéphrites. Celle-ci, par suite de la chronicité, sont responsables de néphrites secondaires, voire directes des altérations rénales.

Les pyélonéphrites posent d'ailleurs un problème particulier. Les connaît leur fréquence au cours de la grossesse. Outre qu'elles créent une hypertension, elles peuvent être à l'origine d'une hypertension gravidique. Dans certains cas, elles peuvent poser un problème diagnostique avec ce syndrome. Fournier a insisté sur ce problème. Sur 1.132 malades à lui adressées pour hypertension gravidique, il n'enregistrait en réalité de pyélonéphrite que dans 73 cas, d'où l'importance de pratiquer un examen sérieux avec urographie.

Les difficultés de diagnostic de l'HTA sont particulièrement en rapport avec l'importance qui réside dans le diagnostic de l'HTA que nous examinons maintenant.

Les renseignements fournis par les divers services de la Direction des Douanes et des Droits de Consommation, ainsi que par les services des Contributions directes, ont été analysés et les résultats en ont été résumés dans le rapport ci-joint.

MODIFICATIONS BIOLOGIQUES
ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES AU
COURS DE DUREE DE TRENTE
GRAVIDES RESIDUANTS

L'étude biologique et expérimentale des différents facteurs qui concourent à la toxicité gravidique résiduelle va nous permettre d'essayer de dégager un mécanisme de l'affection.

LA RETENTION D'EAU ET D'ÉLECTROLYTES

Il s'agit de la rétention d'eau et d'électrolytes dans l'organisme. Il s'agit d'un phénomène complexe, mais pour l'instant la rétention d'eau et d'électrolytes est la première cause de l'affection.

A - LA RETENTION CLINIQUEMENT OBSERVÉE

Depuis que le régime démodé a été appliqué empiriquement par les médecins, de nombreux auteurs ont tenté d'objectiver la rétention.

Les uns ont cherché à mesurer la rétention d'eau et d'électrolytes par des méthodes indirectes, d'autres ont cherché à mesurer la rétention d'eau et d'électrolytes par des méthodes directes.

atteintes de dysgravide. Ils notent une certaine rétention d'électrolytes dans la grossesse normale; dans les dysgravides, la rétention est beaucoup plus importante. Les deux groupes de sujets présentent une diurèse sodée dans les jours qui suivent l'accouchement habituellement vers le 5ème jour.

Dans une autre série d'expériences portant sur 5 malades atteintes de dysgravide, ils donnent un régime contenant 2,37 grs de sodium par jour. Ils constatent une rétention sodée jusqu'à la parturition puis un bilan sodé très négatif (maximum du 5ème jour au 5ème jour après l'accouchement).

Pegg, étudiant la rétention hydrochlorurée chez des femmes atteintes de toxémie normale, les divise en deux groupes: le premier où l'élimination est normale et dont 15 seulement feront une toxémie. Dans le second, la rétention est exagérée et 70% des sujets feront une toxémie.

Illekman a longuement étudié la question. Faient des perfusions de 1 litre de sérum salé à 2,5% à quatre lots de femmes saines, normales, hypertendues, pseudo-pré-éclampsiques, et pré-éclampsiques. Il ne constate une baisse d'élimination chlorurée-urinaire que dans le dernier groupe. Il insiste sur l'importance de la rétention d'électrolytes dans les toxémies qui surviennent dans l'imp-

temps à excréter une quantité donnée de chlorure de sodium que les femmes enceintes normales.

Dans ces dernières années, l'étude de la répartition du sodium a été entreprise par de nombreux auteurs grâce à l'utilisation du sodium marqué Na^{24} .

Cox et Chalmers ont étudié le devenir du Na^{24} injecté juste avant la délivrance au cours de 19 grossesses normales et de 20 grossesses toxiques. Ils constatent chez les toxiques une augmentation de l'"espace sodique" par rapport à celui des grossesses normales.

Gray et Flann, pratiquant la même expérience chez 10 primipares apparemment normales ne trouvent pas de modifications notables de l'"espace sodique" (24%) ou du "sodium échangeable" (39 meq. rapportés au Kg de poids) soit chez une femme qui présente ultérieurement une hypertension gravidique. Dans la grossesse normale, le poids de sodium était de 26 Meq. par semaine, soit 300 Meq. au total. Les produits de gestation et l'accroissement du volume sanguin de la mère suffisent à expliquer cette augmentation. Il conclut à l'absence de rétention sodée au cours de la grossesse normale.

Jennett et Clayton injectant deux le sodium marqué Na^{24} à des femmes normales et toxiques ont constaté une augmentation de l'"espace sodique" chez les toxiques.

les malades atteints de toxémie. Cet effet ne se produit pas si l'injection a lieu dans un muscle strié périphérique. Ils pensent que ce fait traduit soit une diminution du flux sanguin dans le muscle utérin, soit une anomalie de la perméabilité capillaire.

Cox et Chalmers, par des expériences très précises ont étudié le passage du Na^{24} dans les différentes parties du produit de la conception au cours de la grossesse normale. Ils notent que la quantité de sodium transférée au fœtus est en moyenne 450 fois plus importante que la quantité nécessaire à sa croissance à une période donnée. Dans 2 cas de toxémie, ils trouvent une augmentation de passage du sodium dans le liquide amniotique.

L'étude du sodium intra-cellulaire a été entreprise par Heyman et coll. Partant de l'idée que dans les toxémies, il y a tendance à l'accumulation de sodium intra-cellulaire et à la perte de potassium, ils étudient le rapport Na/K dans les globules rouges et le plasma de 7 femmes non atteintes, 7 femmes atteintes moyennes et 18 patientes présentant des signes de toxémie. Dans la toxémie, ils trouvent une augmentation notable de ce rapport, plus élevée dans les globules rouges que dans le plasma, et ce d'autant plus que la toxémie est plus sévère et que le patient est plus âgé.

régime désodé.

Raah et coll., comparant l'action de perfusions de nor-adrenaline et d'adrenaline chez des femmes non enceintes, des femmes enceintes normales et toxémiques, ne constatent aucune différence selon que la patiente est enceinte ou non. Par contre, chez les toxémiques, la réactivité au test est augmentée. Ils attribuent ce fait à une activation de sodium dans les cellules des muscles lisses des vaisseaux, comme on crée la desoxy-corticothérapie chez l'homme normal. Ils insistent sur le fait que l'absence de modification de sodium ne peut pas être considérée comme une indication à l'administration de potassium. Ils concluent que l'absence de modification de sodium ne peut pas être considérée comme une indication à l'administration de potassium.

Ainsi, il régit un certain désaccord entre les divers auteurs quant à l'existence d'une réaction saline dans la grossesse normale. Il nous semble que les expériences faites avec des sels de sodium, à doses élevées, ne peuvent pas être considérées comme une indication à l'administration de potassium. Elles ne peuvent pas être considérées comme une indication à l'administration de potassium.

1910

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

nos expériences concordent à confirmer l'existence d'une rétention avec bilan sodé positif, retard et baisse de l'élimination rénale. Cette rétention est non seulement extra-cellulaire, mais également intra-cellulaire, tendant à déplacer le potassium intra-cellulaire.

Le métabolisme des électrolytes est indubitablement perturbé dans le diabète, mais nous ne pouvons en dire plus.

8) - LA RÉTENTION HYDRIQUE

Elle est à l'origine de l'augmentation anormale de poids ou de l'œdème cliniquement apparent.

Nous avons vu l'importance de l'augmentation anormale de poids dans le diagnostic précoce de la toxémie. Chesley a fait une étude critique de sa valeur et de sa signification en matière de pronostic, clinique et toxémique. Reprenant toutes les statistiques publiées sur le gain de poids dans la grossesse normale, il trouve une moyenne de 25 livres pour les primipares et de 23 à 27 livres. Il existe donc de larges variations. Au cours du premier trimestre l'augmentation est en moyenne de 2.5 livres; au cours du deuxième et du troisième trimestre de 11 livres chacun. Le gain moyen hebdomadaire pendant le troisième trimestre est de 0.82 livre, mais là encore, les variations sont considérables. Les facteurs influençant le gain de poids sont la

... la prise de poids au cours de la grossesse est un élément à surveiller. Dans la toxémie, ce n'est pas la prise de poids totale qui compte mais une prise de poids anormalement rapide à un moment donné de la gestation. (Voir note).

Une augmentation de plus de 5 livres par mois signifie rétention d'eau et toxémie. Dans la grossesse normale la perte de poids après accouchement est d'environ 20 livres. Cette perte est plus importante après une grossesse toxémique (environ de 5 livres, mais évidemment variable avec l'importance de la rétention).

Le même auteur et ses collaborateurs ont étudié la rétention des liquides extracellulaires par le triphosphate avant et après l'accouchement chez des femmes saines et chez des femmes atteintes de toxémie. Ils ont trouvé une perte moyenne de 10 à 15 livres pendant les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Les données de " l'eau disponible " ainsi mesurée rend compte, avec le poids du produit de la gestation, de la prise de poids au cours de la grossesse normale.

Pratiquant systématiquement la même mesure dans les 10 dernières semaines de grossesse apparemment

du corps. Cette "anémie" ne s'accompagne pas de troubles
2. Les troubles de la circulation sont les suivants :
(55% à 85% de troubles de la circulation).

Après un séjour de 24 à 48 heures au repos, les troubles
de la circulation sont toujours présents, 25,5% par la
méthode de la circulation.

Nous avons vu que Gray et Viscé ont trouvé une
augmentation de la "anémie" au cours de la
toxémie gravidique.

D'après Dickman, il existe une accumulation
d'acide urique au cours de la toxémie gravidique,
mais également un retard de l'élimination. Ce retard est
notable de l'acide urique, mais pas de l'acide
de l'urée. Il affirme que 50% des cas de
toxémie gravidique ont un taux de l'acide urique
supérieur à celui de l'acide urique normal.
avec l'hypertension.

Enfin, la toxémie gravidique est caractérisée
par une élévation de l'acide urique et de l'acide
de l'urée. Ce retard est dû à une diminution
de l'élimination de l'acide urique. Les troubles
de la circulation sont les suivants :
2. Les troubles de la circulation sont les suivants :
(55% à 85% de troubles de la circulation).

En conclusion, il existe au cours des hypertensions gravidiques, une rétention hydrique excessive, largement en retardation par rapport à ce qui se passe dans les grossesses normales. Cette accumulation d'eau est probablement secondaire à une rétention chlorurée sodique.

On ne peut évaluer une rétention hydrique sans immédiatement se demander quel est son état du rein.

C'est là l'objet de notre prochain chapitre.

LES MODIFICATIONS RENALES

A) - Les épreuves rénales dans la grossesse normale et toxémique.

Les modifications des fonctions rénales au cours de la grossesse normale doivent être étudiées en relation avec l'hématologie préventive à titre de point de comparaison. Les clearances aux diverses substances ont été étudiées.

- Clearance de l'urée augmentée (Lemoine et Coll. Nice) ou normale (Chesley)

- Clearance de l'acide urique normale (Chesley et coll. Denver et coll. New York)

Clearance de l'acide urique normale (Lemoine et coll. Nice)

- et Lange, Lambiotte et coll.)
- Clearance de diacétate urique (Ull et coll.)
- Clearance du sang et de l'acide urique normal-
nippurique normale ou augmentée (Adams et coll.)
- Clearance de l'histidine, étudiée du fait de l'histidine existant au cours de toute grossesse normale, augmentée (Page et coll.).

En définitive, au cours de la grossesse les fonctions rénales sont normales voire améliorées à la fin.

Il n'y a pas de modification de l'apparition urinaire de la créatinine au cours de la grossesse.

La clearance de l'urée est normale ou diminuée (Chesley et coll.)

- Par contre, la clearance de l'acide urique est nettement diminuée, se mise en parallèle avec la clearance uréique, mettant en évidence une diminution entre une clearance normale ou légèrement abaissée de l'urée et un abaissement important de celle de l'acide urique est de bonne valeur d'après les auteurs de l'hypertension gravidique (Chesley et coll., Langer et coll., Gellert). Cette baisse de la clearance de l'acide urique ne peut expliquer le rôle de l'acide urique dans la grossesse normale.

(Dill et coll.) sont variables pour certaines (Carter et coll.) qui le considère comme normal s'il n'existe pas d'albuminurie, et dans ce cas, on considère le basculement de l'équilibre osmotique comme parallèle à la gravité de l'hypertension artérielle.

- La réaction de filtration (rapport entre le flux renal plasmatique et la filtration glomérulaire) est vraisemblablement régulée pour certaines espèces (Dill et coll., Kenny et coll., Page). D'autres espèces ont des modifications inconstantes (Turner et Hawk).

Tout en établissant le mécanisme intime des altérations des fonctions rénales, certains auteurs ont émis l'hypothèse des modifications des artères rénales, et en particulier l'existence d'un système de "artères afférentes" (Dill et coll., Carter et coll., Kenny et coll.). La résistance artériolaire pourrait atteindre 20 à 30 fois la résistance normale et $\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{3}$ de celle des artères efférentes (Kenny et coll.). Cette augmentation de la résistance artériolaire pourrait entraîner la mise en jeu des choses de l'axe rénal, ainsi le taux de flux renal plasmatique (Turner et coll.).

Il est évident que les modifications rénales, si elles existent, sont le résultat de l'hypertension artérielle.

On peut donc conclure que l'hypertension artérielle

pouvant faire hésiter à permettre une grosse utilisation, les réactions sont en fait des réactions de transition.

Les réactions d'oxydation des métaux sont bien le type de réaction qui se fait avec les modifications fonctionnelles du site de l'oxydation oxydante. Sous l'effet de l'oxydation, il existe des réactions particulières de transition. Elles sont d'ordre spécifique et ne se résignent pas d'une attitude réactionnelle profonde. Lorsqu'on la retrouve, elle serait le témoin d'une altération réactionnelle préalable. C'est d'ailleurs ce qui semble confirmer l'étude des

B) Modification des réactions

L'aspect microscopique est assez particulier et tous les auteurs s'accordent à le décrire comme un gonflement marqué de la cristalline.

L'aspect microscopique est un peu plus difficile

1) Le gonflement apparaît d'abord de manière assez discrète, se traduit par les réactions de transition. Il est d'ailleurs d'ordre réactionnel et se traduit par les réactions de transition.

le gonflement glomérulaire (Bell, Baird-Dunn, Poliak et coll.) (Mason enfin nie l'existence d'un épaisissement de la base et attribue la distorsion glomérulaire à la dilatation des cellules endothéliales et à leur prolifération).

2) Les lésions tubulaires

Certains auteurs signalent la présence dans l'épithélium tubulaire de gouttelettes cytoplasmiques associées à des cylindres à parois épaissies (Mason, Boyan). Mais on trouve parfois la présence des cylindres hyalins sans association à la lésion glomérulaire. Enfin dans certains cas on trouve que l'hyaline tubulaire est pas fréquente et pas vraiment pathologique.

3) Les lésions vasculaires

Les lésions glomérulaires sont retrouvées dans les parties de l'artériole afférente (Mason et Boyan, Mason, Poliak et coll., postiques des parties distales chez 10 malades atteints d'hypertension artérielle de la grossesse ont été en plus de certains degrés de sclérose vasculaire; mais ils ne précisent pas comment a été opérée la sélection de leurs malades et il peut s'agir de l'hypertension post-partum.

nécessaire corticostéroïde du rein et le syndrome du néphron terminal, causes les plus fréquentes d'anurie au cours de la grossesse, ne sont pas spécifiques de l'hypertension artérielle, mais peuvent survenir avec un développement prématuré du placenta.

Green discute la spécificité des lésions de la dysgravide, car étudiant les reins de 12 malades décédées au cours de la grossesse sans autre cause évidente de décès, il observe des lésions caractéristiques mais à un degré moindre.

Ces lésions sont considérées comme transitoires par la plupart des spécialistes, disparaissant avec la dysgravide (Ober et coll., Baird-Dunn, Sheean). Cependant, dans certains cas, le développement de la maladie est suffisant pour obscurcir la lumière du capillaire, il y a dégénérescence du glomérule. Pollak et Coll., ont confirmé récemment la réversibilité des lésions en pratiquant des biopsies répétées avant et après des corticostéroïdes. Il ne paraît que des signes de lésions transitoires par le fait que les glomérules de l'autopsie

paraissent semblant spécifiques, mais bénignes et régressives, telle peut être la conclusion de ce chapitre. Invitant à conclure avec Ober et coll., que la mort de l'ectoplasme n'est pas la cause de l'hypertension

... les hormones sexuelles et ...
autres. Cependant, Schnelder et coll. tenants de
cette théorie n'ont pu reproduire l'hydropnephrose de
la grossesse par injection associée de progestarone, de
œstrogènes et de gonadotrophine chorionique. Ils
insistent d'ailleurs que les doses administrées étaient
insuffisantes.

Les partisans des facteurs mécaniques semblent
l'emporter, mais il est impossible d'exclure la partici-
pation d'une influence hormonale dans ces
modifications.

MODIFICATIONS CIRCULATOIRES

Comme le dit Page, étant donné les modifications des fonctions vasculaires qui surviennent pendant la grossesse normale, l'on peut trouver surprenant que le régime de tension artérielle soit maintenu à un chiffre physiologique. Le facteur majeur tendant à rompre l'équilibre physiologique est l'existence d'un shunt artériocaveux placentaire qui entraînerait, s'il n'était pas compensé, une baisse de la tension artérielle.

Une baisse tensionnelle survient d'ailleurs de la 6^{ème} à la 32^{ème} semaine de la grossesse atteignant 10 mmHG; puis elle s'élève progressivement pour atteindre le niveau antérieur à la grossesse dans les jours qui précèdent l'accouchement.

Il est donc évident que la grossesse normale est caractérisée par une

tion du débit cardiaque pour atteindre le maximum de plus du chiffre initial. Cette augmentation du débit maximum vers le 3ème - 4ème mois pour décroître vers un taux normal dans les dernières semaines (Lancet et coll., Page et Ogden, Ordman, Dierksen).

La masse sanguine est augmentée, tous les auteurs s'accordant à le dire. Cette augmentation de la masse sanguine s'accompagne d'une baisse de la viscosité avec hémodilution.

La pression veineuse, normale sur certains points, est anormalement augmentée dans le foetus et dans les premiers jours de la vie. Cette augmentation de la pression veineuse de la partie inférieure du corps est due pour la plupart des auteurs à l'augmentation de la pression artérielle. Page n'est pas le seul à dire cela. En fait, la mesure directe il paraît que la pression artérielle est normale. Il constate une élévation de la pression artérielle, mais cette élévation est beaucoup moins importante après l'hystérectomie. Il conclut que les facteurs mécaniques jouent un rôle mais qu'il y a aussi une augmentation de la pression artérielle et que les vaisseaux périphériques sont dilatés.

Les modifications circulatoires tendent à faire baisser le débit et la tension artérielle pendant la grossesse et après l'hystérectomie. Les modifications circulatoires tendent à faire baisser le débit et la tension artérielle pendant la grossesse et après l'hystérectomie.

violaine (Page, Ordman).

Dans la dysgravide pure, les modifications survenues sont celles de la masse sanguine. Elle est diminuée.

Pour Page, il y aurait augmentation de volume sanguin associée d'ailleurs à une baisse de la viscosité sanguine. L'auteur ne pense pas que cette augmentation de la masse sanguine joue un grand rôle dans la détermination de l'hypertension artérielle.

Preis et Kenny, Dieckman, au contraire trouvent dans le pré-éclampsie une masse sanguine abaissée avec hémocoagulation. Ils attribuent une valeur pronostique à la gravité du syndrome ainsi parallèle à l'importance de la diminution de la masse sanguine et à l'hémocoagulation. Dieckman va jusqu'à montrer une certaine signification à la persistance d'une hémocoagulation malgré un traitement correct.

Cette divergence de vue est peut-être la conséquence d'une étude pratiquée à des stades différents de l'évolution. En effet, Preis signale que chez les cas de toxémie légère, des perturbations sont observées, mais que dans les cas graves, les perturbations sont plus marquées. (Preis et Kenny, 1934). Cette divergence de vue est peut-être la conséquence d'une étude pratiquée à des stades différents de l'évolution. En effet, Preis signale que chez les cas de toxémie légère, des perturbations sont observées, mais que dans les cas graves, les perturbations sont plus marquées.

CONCLUSIONS

Malgré une élévation élévoée de la tension sanguine au cours des hypertensions gravidiques, ces élévations lui confèrent une signification pronostique, les élévations élévoées importantes ne se voyant que dans les cas graves (Freis et Kenny, Pigeaud et Burdick).

Certaines (Charvillet et coll.) ont tenté de préciser les modifications au cours des grossesses normales et pathologiques par électrophorèse. Dans la gestation normale, ils trouvent les perturbations suivantes: diminution des albumines (12%), augmentation progressive des alpha 1 globulines (61% au 9ème mois) et des bêta globulines (34% au 9ème mois) tandis que les alpha 2 globulines restent stables.

Pratiquant des électrophorèses chez les malades présentant des grossesses anormales, qu'il s'agisse de

trouvée pure, on soupçonne une affection particulière (hypertension artérielle persistante ou hypertrophie ventriculaire), ils constatent des perturbations communes à tous les types d'affection. Ces modifications sont de même nature que celles constatées au cours de la grossesse normale mais fortement exagérées. Elles sont caractérisées de même que lors de la grossesse normale. La sécrétion de l'hypoprotéidémie artérielle persiste au dehors de la grossesse. Le retour à la normale de l'électrophorèse se fait environ 3 mois après l'accouchement.

L'importance de l'hypoprotéidémie a été très diversement appréciée. Simple témoin de l'affection, ou cause de certains de ses signes, nous reviendrons ce propos à propos du mécanisme de l'affection.

LES MODIFICATIONS HORMONALES

Depuis les mémorables travaux des Smith, l'étude des perturbations hormonales pendant la grossesse normale et pré-éclampsique est à l'ordre du jour. Cette étude a rendu le problème plus complexe, mais elle a ouvert de nouveaux horizons, et permettra prochainement de parvenir à une connaissance parfaite de l'origine et du mécanisme de l'éclampsie.

41 - LES HORMONES PLACENTAIRES

Dans les études tout d'abord faites, on a constaté de longue date, elles ont donné lieu depuis à des controverses acharnées.

La preuve expérimentale de la présence d'hormones dans le placenta a été apportée par le fait que l'administration de l'hormone placentaire aux animaux déficients en hormones, provoque chez eux des effets identiques à ceux observés chez l'homme.

Le placenta est une glande endocrine importante, sécrétant sans doute toutes les hormones sexuelles, l'œstrogène, et gonadotrophine. Il est aussi producteur des diverses hormones soient sécrétées par les ovaires, nous y reviendrons.

C'est en France, Milliez à Paris et Pineau à Lyon et leurs écoles qui ont étudié leurs hormones au cours des périodes normale et pathologique.

1) LES GONADOTROPHINES

Même que leur dosage soit assez compliqué et parfois peu fiable, il semble qu'elles soient considérablement diminuées au cours de la grossesse, peut-être par défaut d'utilisation (Smith, Milliez et Fritel, Lloyd et coll.)

2) LA FOLLICULINE (Phenolstéroïdes)

Dans la grossesse normale, l'élimination urinaire des oestrogènes est accrue. Des courbes d'élimination au cours de la grossesse ont été réalisées par Lemoine. Elles montrent qu'il existe une augmentation relative des oestrogènes à partir du 3ème mois, augmentant considérablement à partir du 6ème mois pour atteindre leur pic le plus élevé à la fin de la grossesse. L'élimination revient à la normale vers les deux jours qui suivent l'accouchement.

L'hypertension gravidique est caractérisée par une élévation considérable du taux d'élimination urinaire des phénolsulfonés. Milliez insiste sur la valeur pronostique de cette baisse d'élimination, de même que Burthuis qui cite comme chiffre limite au-dessous duquel l'alarme est donnée 3.000 grammes par 24 heures. Plus précisément, cet auteur étudie le rapport entre la filtration DP (estimation par créatinine) et une fraction γ (phénolsulfoné). Normalement inférieur à 10, il s'élève au signe d'alarme s'il est supérieur entre 10 et 15. Un chiffre de 30 ou plus grand indiquerait le port de l'enfant à terme.

3) LA PHÉNOLSULFONÉ ET SON MÉTABOLISME (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (1946) (1947) (1948) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (2063) (2064) (2065) (2066) (2067) (2068) (2069) (2070) (2071) (2072) (2073) (2074) (2075) (2076) (2077) (2078) (2079) (2080) (2081) (2082) (2083) (2084) (2085) (2086) (2087) (2088) (2089) (2090) (2091) (2092) (2093) (2094) (2095) (2096) (2097) (2098) (2099) (2100) (2101) (2102) (2103) (2104) (2105) (2106) (2107) (2108) (2109) (2110) (2111) (2112) (2113) (2114) (2115) (2116) (2117) (2118) (2119) (2120) (2121) (2122) (2123) (2124) (2125) (2126) (2127) (2128) (2129) (2130) (2131) (2132) (2133) (2134) (2135) (2136) (2137) (2138) (2139) (2140) (2141) (2142) (2143) (2144) (2145) (2146) (2147) (2148) (2149) (2150) (2151) (2152) (2153) (2154) (2155) (2156) (2157) (2158) (2159) (2160) (2161) (2162) (2163) (2164) (2165) (2166) (2167) (2168) (2169) (2170) (2171) (2172) (2173) (2174) (2175) (2176) (2177) (2178) (2179) (2180) (2181) (2182) (2183) (2184) (2185) (2186) (2187) (2188) (2189) (2190) (2191) (2192) (2193) (2194) (2195) (2196) (2197) (2198) (2199

Figes, au tour au-dessus de 30 mg par 100 g de sang, entre 15 et 30 mg par 100 g de sang. Le taux inférieur à 15 mg par 100 g de sang doit faire redouter la mort du fœtus in utero.

Idem facteurs influent sur l'élimination normale et doivent être pris en considération pour évaluer la valeur des résultats:

- Facteur racial: L'on connaît qu'une minorité importante de la population humaine puise l'insuline sur le tour de l'élimination de glucose. Ainsi, dans le cas de diabète chronique, Figes et coll. ont trouvé un pourcentage de 20% de diabétiques au tour de l'élimination de glucose. Ce pourcentage est inférieur à la valeur de 15 mg par 100 g de sang.

- Facteur sévère: L'on connaît l'importance de l'insuline dans le métabolisme normal: glyco-métabolisme et l'on peut penser qu'une altération des fonctions hépatiques par une maladie ou une infection peut altérer le métabolisme de l'insuline. Cependant, Figes et coll. ont pu mettre en évidence des altérations des fonctions hépatiques en relation avec une perturbation des éliminations hormonales.

4) - CORRELATIONS ENTRE LES NIVEAUX DE LA GLOBULINE ET LE PROJECTION

Les Smith ont insisté sur l'importance des

des deux hormones et ont proposé le schéma

		GONADOTROPHINES	
Progestérone	oestradiol	progestérone	oestradiol
	oestrone-lactone	oestrone	Produits
			inactifs
pregnandiol	oestriol		
Grossesse normale loin			
du terme			

La réaction oestrone-oestriol ne se fait qu'en présence de quantités infinitésimales de progestérone, dans le métabolisme après une formation de produits d'oxydation inactifs.

Le métabolisme de la progestérone est soumis à l'action de produits de dégradation de l'oestrone (oestrone-lactone).

Ces faits ont permis à Milliez d'établir une gradation dans la gravité des troubles hormonaux observés. Un déficit isolé en oestrogènes implique une hypertension gravidique peu sévère et pouvant être améliorée par l'administration de di-éthyl-stibœstrol. Associé à un déficit d'élimination de pregnandiol, son pronostic est

beaucoup plus grave et le traitement associe progesterone et di-ethyl-oestriol est généralement illusoire.

Si ce schéma est discuté à l'heure actuelle d'un point de vue théorique, il reste que les déductions cliniques, pronostiques et thérapeutiques auxquelles il a donné lieu sont applicables d'un point de vue pratique.

En définitive, il semble prouvé que dans l'hypertension gravidique, il y ait une augmentation des gonadotrophines placentaires, contrastant avec une baisse plus ou moins importante de l'élimination de phénols stéroïdes et de pregnandiol. Défaut d'excrétion rénale, tremblement du métabolisme ou défaut de production par le placenta? Sous l'angle médical nous devons nous rapprocher quelque peu de l'idée que les troubles métaboliques, quoiqu'il en soit, ses perturbations se manifestent par des modifications que l'on a pu en fin de compte et bien que certains auteurs ont pu parler de "vieillesse prématurée du placenta".

B- LES HORMONES SURRÉNALIENNES

Nous arrivons ici à un sujet de pleine actualité et en perpétuel remaniement. Nous pensons donc plus sage de négliger les études qui datent d'un certain nombre d'années pour nous concentrer sur les travaux plus précis de ces derniers temps. Bien que parfois

contradictoires, ils donnent une idée plus juste des modifications au cours de la grossesse normale et de l'hypertension gravidique.

1) LES 17 CETO-STÉROÏDES (androgènes)

Les dosages de 17 ceto-stéroïdes sont assez contradictoires. Les premiers auteurs qui aient étudié la question avaient été déçus par une baisse de l'élimination urinaire. En fait, Millies et Fritel, au cours d'une étude expérimentale, ont trouvé des chiffres anormaux d'élimination. Tel est l'avis également de Tanning et de Koligly. Ces auteurs signalent une erreur possible qui représente l'élimination des 20 ceto-stéroïdes qui précipitent avec les 17 ceto-stéroïdes. Ils recommandent la fraction comprenant le corticostéroïde, métabolite de la progestérone. Elle est fortement augmentée au cours de la grossesse normale, relativement abaissée au cours des dyssémiés. Jailer et Knowlton sont en désaccord avec les conclusions pré-citées. En effet, étudiant l'élimination de 17 ceto-stéroïdes au cours de la grossesse chez des patientes atteintes de maladie d'Addison, ils constatent une élimination normale de 17 ceto-stéroïdes et une augmentation de cette élimination sous perfusion d'ACTH. Ils concluent à la sécrétion de 17-ceto-stéroïdes par le placenta.

Les deux thèses ne sont pas inconciliables. Il est possible que le placenta sécrète des androgènes au cours

de la grossesse chez les Addisonniennes, venant suppléer à la carence des surrénales. Ainsi, dans la grossesse normale comme dans la grossesse chez l'Addisonnienne, le taux d'élimination urinaire est comparable aux taux physiologiques. L'augmentation d'élimination urinaire n'est pas due à une hyperfonctionnement des surrénales mais à une augmentation de la filtration glomérulaire.

2) LES GLUCO-CORTICOIDES

Contrairement à l'opinion classique qui considérait une augmentation considérable des cortico-stéroïdes au cours de la grossesse humaine et animale, MILLER et FRISZ et FIGUEROA trouvaient dans leurs études des taux voisins de la normale. D'autres auteurs ont trouvé respectivement des taux très élevés (Perrissin et coll., 1951 et coll., 1952 et coll.) ; Gossell, étudiant le taux de 17 hydroxy-cortisol-métabolites méconine chez 124 femmes enceintes normales trouve une augmentation nette par rapport au taux constaté chez la femme non enceinte (5 microgr.). Cette augmentation est au maximum vers le 3ème trimestre (20 microgr.). Les chiffres sont très élevés tout de suite après l'accouchement (36 microgr.) mais tombent très vite après celui-ci pour atteindre 2 microgr. au 6ème jour.

Certains auteurs interprètent ces faits comme un hyperfonctionnement surrénalien et signalent l'existence d'une hypertrophie surrénale au cours de la grossesse

(Karylinson et coll.) démontre le rôle du placenta
(Vanning).

D'autres pensent que l'augmentation d'élimination
est due à la production de plus d'hormones par le placenta.
Ainsi Johnson et Reines ont trouvé une activité glucocorticoïde biologique dans le placenta humain d'environ 1/10 de celle de la surrénale dans des conditions identiques. De Courcy et coll. ont trouvé une contenance d'environ 100 microgr. de substance semblable à la cortisone par placenta humain débarrassé avant qu'il se peut de son sang. Davis et Plotz ont montré que la surrénalécémie avec le test positif s'observait fréquemment chez la grossesse et elle était pratiquée dans la première moitié de la gestation. Par contre, si l'hypertension avait lieu lors de la troisième moitié, la grossesse se poursuivait normalement.

En fait, le problème est plus complexe. Vanning, Simpson et Singer analysent 17 grossesses normales, 14 hypertensions gravidiques et 6 hypertensions permanentes et ont constaté que les 17-hydroxy-stéroïdes totaux sont éliminés à un taux normal dans toutes les grossesses sauf dans les grossesses toxiques où ils sont légèrement diminués. Par contre, les corticoïdes déconjugés sont augmentés dans les trois types et augmentent dans les grossesses normales et les premières légers et moyennes. Dans les cas graves l'augmentation est plus

discret et particulier en ce qui concerne la gestation conjuguée.

Besulian et Jaffe trouvent dans la grossesse normale une élimination de 17-hydroxy-stéroïdes dans les limites physiologiques. Par contre, les corticoides réducteurs et les DNPH (réagissant avec la di-nitro-pyruvyl-hydrasine) sont augmentés. Des chromatographies, ils montrent que l'augmentation est due à la présence de trois stéroïdes réducteurs qui sont des stéroïdes mineurs. En effet, leur élimination n'est pas augmentée par l'administration de stéroïdes minoraux ou de progesterone.

Besulian, Feleire et Jaffe publient à propos de ces cas de grossesse avec des addictions au traitement à pu être augmentés, comme en contradiction avec l'idée que la présence de cortisol et cortisone et hydrocortisone. L'amélioration produite par la grossesse serait due à la production par le placenta de corticoides réducteurs et DNPH. Dans la grossesse normale, il y a une augmentation des 17-hydroxy-stéroïdes dans la sang et dans les urines. De même, il y a une augmentation d'un degré de l'iodination du foie, l'augmentation au cours de la grossesse.

En conclusion, au cours de la grossesse normale, les 17-hydroxy-stéroïdes libres sont augmentés mais il n'y a pas d'augmentation des 17-hydroxy-stéroïdes

connus (compromettant les stéroïdes-conjugés). Il ne s'agit pas d'une hypersecretion mais d'un défaut de sécrétion. Ces stéroïdes ne seraient pas sécrétés par le placenta.

Les corticoïdes révélateurs au contraire sont augmentés dans leur fraction libre et conjugués et sont sécrétés par le placenta expliquant l'amélioration du syndrome Addisonien et la polysémie chronique évolutive pendant la grossesse.

Dans la grossesse toxémique, les dysénergies apparentes peuvent être le fait de la confusion qui règne quant aux stéroïdes sécrétés par les différents chorions. L'on peut penser à titre d'hypothèse, qu'il y a augmentation de l'hydrocortisone libre et conjuguée d'un côté et un défaut de sécrétion des stéroïdes conjugués de l'autre. En effet, les stéroïdes conjugués sont normaux, car il n'y a pas de modification de fonctionnement surplacental. Par contre, la part des corticoïdes révélateurs serait évaluée par rapport à la grossesse normale, ces hormones étant d'origine placentaire.

3) LES MINERALO-CORTICOÏDES

a) La desoxy-corticostérone

Les études de Felge sur le syndrome d'adaptation suggèrent que cette réaction de l'organisme n'est pas provoquée par une augmentation des stéroïdes

corrélation entre le déséquilibre entre minéral et glucocorticoïdes. L'auteur propose cette explication pour l'hyperaldostérisme. Il soutient que les troubles observés au cours de la dystrophie et en particulier les modifications électrolytiques sont dus à une hypersecretion de desoxycorticostérone ou à un déséquilibre hormonal.

Ils sont secondaires en cette voie par les chercheurs qui ont cherché à créer un syndrome de Cushing gravidique chez l'animal par administration de cette hormone. En fait, l'administration isolée de desoxycorticostérone n'a jamais suffi à elle seule à créer un syndrome ressemblant à la dystrophie humaine. Manson et coll. ne constataient aucune modification évoquant la toxémie humaine par simple injection hormonale associant une dose élevée de desoxycorticostérone et une dose élevée de rénine. Parvainen et coll. pensant reproduire des signes évoquant l'hyperaldostérisme gravidique par l'injection de desoxycorticostérone et surcharge saline. Ils ont fait deux résultats sont assez concordants. Manson et coll. associent chez les rats pendant la grossesse l'hyperaldostérisme et l'injection de sérum de placenta animal.

Beaucoup plus probante semble l'expérience d'Assali
et al. (1961) qui ont administré à 10 femmes souffrant de toxémie
gastro-intestinale 10 mg de corticostéroïdes pendant 7 jours. Le desoxy-
corticostéroïde n'a pu provoquer aucune modification
évoquant la toxémie.

Aucun auteur ne fait état d'un dosage biologique
mettant en évidence une augmentation de la desoxy-corti-
costéroïde au cours de la toxémie gravidique.

Il ne semble pas en définitive que l'on puisse pen-
ser à une augmentation de la sécrétion de corticostéroïdes au cours
de la toxémie gravidique. La sécrétion de ces hormones semble
une prédominance à son activité.

b) L'aldostérone

Chart, Shipley et Nagasawa ont étudié l'élimination
urinaire d'un facteur de rétention sodée. Évaluant bio-
logiquement la rétention de sodium par l'organisme, on
a constaté que la rétention de sodium est normale ou très légèrement su-
périeure à celle de sujets en dehors de la gestation
(60 à 100 microgr). Au cours des hypertensions gravidi-
ques, ils notent des taux de 2 à 10 fois plus importants
avec de larges fluctuations semblant en rapport avec l'im-
portance de la rétention sodée et disparaissant rapide-
ment après l'accouchement. Ce facteur de rétention

origine surrénalienne (excrétion augmentée par l'administration d'ACTH) mais celle des corticoïdes placentaires). Il serait différent de la (desoxy-cortico-sérone) car les constatations cliniques et les résultats de la détermination de l'excrétion sont différents de ceux observés chez les sujets atteints d'hyperadrenocorticisme.

Ce facteur semble identique à l'aldostérone. Dans une première publication sur l'élimination d'aldostérone dans l'hypertension gravidique, Venning et coll. faisaient état d'une augmentation de cette excrétion. Ultérieurement des études plus précises firent réviser leur position à ces auteurs. Dans la grossesse normale, ils ne trouvent pas de modifications de l'aldostérone libre mais une augmentation importante de l'aldostérone conjugué (dont l'augmentation de l'aldostérone total) qui baisse rapidement après l'accouchement. Dans l'hypertension gravidique, il n'y a pas d'augmentation de l'aldostérone total par rapport à la grossesse normale mais un accroissement de la fraction libre par rapport à la fraction conjuguée.

Martin et Mills ont confirmé ce résultat. Chez la femme en dehors de la gestation, ils constatent un taux d'élimination d'aldostérone total de 2 microgr. Ce taux chez la femme enceinte normale est de 10 microgr. La même constatation est faite chez les hypertensions

Graviditoses n'ont pas différé de la quelle est au cours des grossesses normales. Les tenant qu'il y a, dans les dysgravitoses, non pas hyperaldostérisme mais déséquilibre entre substances favorisant l'excrétion sodée et substances favorisant la rétention.

Conclusion de cette étude sur les hormones

Il semble à première vue difficile de tirer une conclusion claire de ces travaux complexes et parfois contradictoires. Mais l'étude nous a permis de dégager une hypothèse générale.

Les hormones d'origine placentaire, progestérone, oestrogènes, glucocorticoïdes rénaux sont les hormones placentaires au cours de la grossesse normale.

Dans l'hypertension gravidique, il existe un déficit relatif de ces hormones attribuable soit à une hyposecrétion placentaire soit à un trouble du rétrocontrôle, soit à un défaut d'élimination rénale, les trois facteurs sont probablement en cause.

Les hormones d'origine purement surrénalienne, glucocorticoïdes, du type cortisone, minéralocorticoïdes voient leur excrétion totale augmentée dans la grossesse normale. Dans l'hypertension gravidique les chiffres totaux d'élimination sont peu modifiés par rapport à ceux de la grossesse normale, mais la

Niveau de glyco-conjugaison est nettement diminué
(insuffisance hépatique ?)

LES LÉSIONS ANATOMIQUES

Nous avons envisagé les lésions réelles lés de l'épave de cet organe. Il nous reste à aborder maintenant les lésions placentaires et fœtales.

A - LES LÉSIONS PLACENTAIRES

Dans notre série, sur 13 placentas examinés, 9 présentaient des anomalies macroscopiques ou microscopiques. La fréquence de ces lésions placentaires est signalée par presque tous les auteurs.

Pour Dieckman, son importance dans la genèse de l'hypertension gravidique est majeure. La modification essentielle est le vieillissement prématuré des villosités. La présence d'infarctus de tous âges est la lésion la plus fréquente. Cependant elle ne serait pas spécifique de la toxémie et se verrait parfois dans la grossesse normale. Même lorsqu'il

Il existe une lésion constante des vaisseaux
maternels. Il s'agit de la présence d'un déficit
uniquement fonctionnel.

Page parle également de vieillissement prématuré
du placenta. Si pour lui les infarctus blancs se
voient dans les grossesses normales et toxémiques, les
grossesses toxiques compliquées d'hypertension gravidique
présentent une aggravation. Il trouve une dimi-
nution de la consommation d'oxygène des placentas au
cours des hypertensions gravidiques.

Assali, étudiant le placenta de grossesses toxé-
miques contre les lésions systémiques du fœtus, constate
nettement dans les 3/4 des cas.

Milliez pense qu'il existe, dans les hyperten-
sions gravidiques, une lésion du placenta à type de
sclérose du placenta.

McKay et coll. décrivent des infarctus de tous
types, de nécrose de la basale, et de dégénérescence
fibrinoïde des artérioles.

Si ces lésions ne sont pas spécifiques, elles
sont du moins constantes et pas une autre se
trouve élevée pour les démentir. L'atteinte est essentielle-
ment vasculaire.

B - LES LÉSIONS HÉPATIQUES

Elles sont constantes mais n'ont été décrites

que post-mortem.

Dieckman pense que l'hémorragie peri-portale suivie de nécrose est assez caractéristique du syndrome d'hypertension gravidique.

Sheean décrit lui aussi des lésions d'hémorragie peri-portale sans ectasie ni thrombose. Parfois existant sous forme de plaques, les cellules hépatiques sont envahies par les rangées de cellules hépatiques et faisant irruption dans les sinus. Ces aspects se verraient dans les cas graves.

Behneiler, tenant de reproduire un syndrome toxémique chez l'animal trouve des lésions hépatiques à type de nécrose zonale, régionale, ou disséminée.

Les lésions hépatiques n'ont jamais été étudiées in vivo. Les épreuves du fonctionnement hépatique que l'on peut faire en clinique sont certes grossières et imparfaites et certains auteurs, les pratiquant au cours d'hypertensions gravidiques n'ont trouvé aucune modification. Dieckman signale cependant avoir trouvé une altération discrète de ces fonctions au cours de la gestation normale, plus importante dans les cas de pré-éclampsie.

C - LES LÉSIONS DES AUTRES ORGANES

Sheean signale avoir trouvé des hémorragies plus ou moins importantes dans l'encéphale, les poumons,

le cœur, les surrénales, voire la glande de mésentère
 abdominale de pré-hypophyse-hypophyse. Ces lésions
 sont inconstantes. Leur être ou non de la mort, elles
 ne sont sûrement pas celles de l'infarctus et n'ont
 aucune spécificité.

Ainsi l'étude anatomopathologique nous a permis
 de dégager 3 grands pôles lésionnels: le cœur, la
 placent et le foie.

Les données de ce chapitre vont nous permettre
 de tenter une explication des grandes manifestations
 du syndrome toxique, puis d'essayer d'en déduire
 le mécanisme général de l'infarctus.

- 100 -

Nous envisageons d'étudier successivement les
grandes modifications des HEP en essayant de préciser
leur mécanisme propre. Puis nous tenterons une synthèse
afin de proposer une solution générale au mécanisme
du syndrome.

MODIFICATIONS HORMONALES

La conclusion de notre chapitre concernant les
hormones était qu'il existait un déficit de l'élimi-
nation urinaire des substances sécrétées par le pla-
centa; par contre les hormones surrénaliennes n'étaient
modifiées que dans leur forme d'excrétion et non dans
leur excrétion totale.

1) L'abaissement d'élimination des hormones placentaires pouvait être dû à trois causes: déficit de
sécrétion placentaire, défaut de métabolisme en par-
ticulier dans le foie, et diminution de l'excrétion
rénale. Or d'est justifié vers une voie présumée

que nous mènent les études anatomo-pathologiques.

La constance des lésions placentaires semble
indiquer la pré-éminence de ce facteur. Elles en-
traînent un déficit de production de progestérone et
d'œstrogène, agissant l'une sur l'autre pour perturber
leur équilibre.

Le trouble du métabolisme hormonal est accentué
par l'altération anatomique du foie, entraînant un défaut de la conjuga-
ison des métabolites hormonaux dans cet organe.

Le facteur rénal nous paraît beaucoup plus secon-
daire. Nous ne devons pas négliger les
perturbations fonctionnelles rénales. Bornons nous
à signaler que, s'il existe un déficit fonctionnel du
rein au cours d'une néphropathie gravidique quelque
soit son type, il doit être pris en considération
dans l'appréciation de la valeur d'un abaissement
éventuel de l'élimination urinaire des hormones.

2) Les modifications de la forme d'élimination
des hormones purement surrénaliennes (rapport hor-
mones libres hormones conjuguées) impliquent une
secrétion surrénale normale, mais une altération du
métabolisme de conjugaison qu'explique fort bien les
perturbations hépatiques.

PHYSIOLOGIE DE LA RETENTION HYDRO CHLORURÉE SODIQUE

Deux facteurs principaux peuvent être envisagés à l'origine de cette perturbation : une diminution de la sécrétion rénale ou un trouble de la perméabilité capillaire perturbant le passage de l'eau et des électrolytes dans les espaces extra-cellulaires. Ces deux possibilités se compliquent l'une l'autre. Mais plusieurs éléments peuvent entrer en jeu pour entraîner leur apparition.

A - L'HYPOPROTEINÉMIE

En entraînant une baisse de la pression oncotique, elle favorise le passage de l'eau et des électrolytes dans les espaces extra-cellulaires. Parmi les auteurs ont-ils mis l'accent sur son rôle.

Strauss pense que la rétention aqueuse chez les femmes enceintes est due en partie à la baisse

des troubles sanguins. Le régime désosé n'agirait
sur la femme enceinte torréfiée que si le taux de pro-
tides n'était pas trop abaissé.

Orloff et coll. ont pratiqué des injections d'al-
bumine désoxylée à 3 semaines d'intervalles. Ils
trouvent chez une malade, que cette thérapeutique ex-
traire les symptômes œdémateux. L'efficacité est
d'autant plus grande que le taux d'albuminémie est plus
bas. L'albumine extraite du sérum d'œuf est efficace, mais
guérison, si la concentration est suffisante, est
une élimination osée. Il conclut que l'œdème, chez
certaines pré-éclampsiques serait dû à une baisse de
la pression oncotique.

Bieckman, dans une première publication, incrimine l'hypoprotidémie dans le geste de la rétention
hyaline-vasculaire, mais est revenu à l'avis que l'œdème
est dû à une élévation du rôle de l'hypoprotidémie
est négligeable.

Enfin, si l'on prend en considération la mor-
talité élevée, la pression oncotique des malades
est très élevée et la rétention de protéines est très
importante. L'œdème est dû à une élévation de la
pression oncotique doit donc favoriser l'éli-
mination d'eau et de sel au niveau du rein et non la
rétention.

L'hypoprotidémie favorise l'extravasation de l'

car de l'hypotension, et par suite, la rétention, également leur élimination rénale.

Les études plus récentes n'attribuent qu'un rôle mineur à l'hypoprotidémie dans le mécanisme de la rétention hydrosaline.

B - L'IMPACT DE LA RETENTION HYDROSALINE

Son augmentation conditionne un ralentissement circulatoire capillaire et favorise la rétention dans les reins.

B - LES MODIFICATIONS RENALES

Déjà dans la grossesse normale, l'atonie et la stase dans les cavités excrétrices est faite pour favoriser la rétention. Nous avons vu que la filtration glomérulaire est due à la différence entre pression capillaire, glomérulaire et pression tubulaire. L'augmentation de celle-ci qu'entraînent hypotonie et stase des voies excrétrices, devrait entraîner une diminution de la fraction filtrée.

De plus, la lenteur de la traversée du filtrat à travers le tubule proximal augmente la réabsorption tubulaire d'eau et d'électrolytes à ce niveau. Ainsi dans la grossesse normale, tout tend déjà au niveau du rein à favoriser une rétention hydro-saline.

L'on conçoit dans ce cas, que, s'il existe des lésions rénales, qu'elles soient primitives ou

naphtalène diméthylé plus récemment (1952) par Taylor et al. (1952) (hypertension gravidique). Cette substance a été utilisée dans le traitement de l'hypertension. Cependant, quelques soient les résultats obtenus, il est évident que cette substance agit peut-être au niveau des capillaires, et en particulier les facteurs hormonaux.

D- LES HORMONES

Nous passerons rapidement sur l'hormone antihypertensive (progestérone) qui agit sur la rétention d'eau (et peut-être prouver l'activité dans la toxémie gravidique - voir aussi la sensibilité particulière). D'autre part, il est évident que la rétention d'eau est liée à la rétention de l'eau. Nous avons vu que celle-ci est liée, dans l'hypertension gravidique, à la rétention chlorurée sodique.

En fait, deux substances nous retiendront particulièrement par leur action sur les électrolytes et l'eau: la progestérone et l'aldostérone.

1) La progestérone

Certains auteurs considèrent que cette substance agit sur la rétention d'eau et expliquent par son augmentation, la rétention des grossesses normales (Taylor, Werner, Welsh).

Mais cette explication est en contradiction avec l'association entre l'hypertension gravidique et la rétention d'eau.

tion hydro-saline accrue et une production de progestérone diminuée.

D'ailleurs Seize, étudiant les effets de la progestérone chez les rats hypophysectomisés ou non, constate que son administration déclenche une diurèse très importante, plus marquée en l'absence de l'hypophyse, (peuvent atteindre 10% du poids de corps par 24 heures).

Cet effet diurétique de la progestérone est confirmé par Besulieu.

2) L'aldostérone est l'hormone de la rétention saline par excellence. Nous avons vu que plusieurs auteurs ont signalé la présence d'un facteur de rétention au cours de la grossesse normale, que nous avons identifié avec cette hormone. Pourtant sa sécrétion n'est pas augmentée dans la grossesse normale. Ce fait peut trouver son explication dans la notion d°

3) Equilibre hormonal

Si l'on admet que dans la grossesse normale, le taux de l'aldostérone n'est pas modifié par rapport à la grossesse normale, mais que la sécrétion de progestérone est considérablement diminuée, l'on conçoit que le déséquilibre entre ces deux hormones influe dans une large mesure sur le métabolisme hydro-salin.

Colly avait déjà supposé à propos de son "syndrome d'adaptation", qu'une hypersécrétion de desoxycorticostérone (DOC) était la cause de l'hypertension. Il avait aussi proposé que l'hypertension était due à une rétention de sodium.

Mais la mesure des hormones dans l'urine a permis de constater que la sécrétion d'aldostérone était normale. Il y avait un déséquilibre entre aldostérone (favorisant la rétention sodée) et prégestérone (favorisant l'excrétion sodée). La diminution de production de prégestérone était due à la prise de la solution chlorurée sodique.

Cette théorie est à rapprocher du rapport de Miller et Mann, qui ont constaté que chez les animaux à une sécrétion normale de l'aldostérone, l'administration d'une solution de chlorure de sodium augmentait la sécrétion de prégestérone. Pourquoi?

Veining et coll., plus prudents, notent que, habituellement, une dépression hydrique ou saline entraîne une hypersécrétion d'aldostérone et l'inverse. Or, au cours de la grossesse normale, il y a augmentation de la rétention hydrosaline et malgré tout la sécrétion d'aldostérone est normale. Il y a donc une cause de compensation de l'hypertension.

l'ensemble cette théorie du déséquilibre hormonal
a été extrêmement séduisante. C'est elle qui rend le
meilleur compte de la succession des faits : lésion pla-
centaire, hypoproduction de progesterone avec sécrétion
normale d'aldostérone, rétention hydro-sodée-urée.

En conclusion, il est visible d'ailleurs que sur
un fond héréditaire, l'absence de certaines
réactions physiologiques rétrogrades, modification
certaines amène les modifications de l'écologie
sécrétoire ou transitoires, d'une manière à la fois
et la filtration glomérulaire et la sécrétion dans les
voies excrétoires et l'équilibre hormonal
agit comme un facteur déterminant sur la rétention
hydro-sodée-urée ou comme un facteur prédisposant.

MECANISME DE L'HYPERTENSION

ARTERIELLE

Dans la grossesse normale, la tendance à la baisse tensionnelle est essentiellement par la diminution artio-veineuse placentaire est compensée par une diminution des résistances périphériques due à un spasme artériolaires. La plupart des auteurs attribuent l'hypertension artérielle de la grossesse à une vasoconstriction de ce spasme vasculaire (Gardner, 1946, Brust et Assali, Pigeaud et coll.). Ceci n'est qu'une explication verbale, car ce qui importe en définitive, c'est la cause de ce spasme vasculaire.

Deux mécanismes peuvent agir pour l'engendrer: un mécanisme nerveux par l'intermédiaire du système nerveux autonome, ou l'élément hormonal, évitant d'insister sur les mécanismes de l'hypertension artérielle.

A - LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME

Son importance a été minimisée par les multiples expériences de Brust, Assali et coll. Ces auteurs ont étudié essentiellement l'action des ganglioplegiques, de la raché-anesthésie haute, des dérivés du veratrum viride et de l'apressoline au cours des grossesses normales et toxémiques.

Intéressant du tetra-ethyl ammonium (TEAO, ganglioplegique) au cours de grossesses normales, d'hypertensions gravidiques et d'hypertensions artérielles permanentes avec protéinurie, ils étudiaient ce qu'ils appelaient le "plancher de TEAO" au tour maximal de la chute de la tension artérielle après injection du produit, de produit entraîne un relâchement du système nerveux autonome. Ils constatent une chute importante de 50 à 60 mmHg dans les grossesses normales et dans les hypertensions permanentes encéphaliques. Par contre, la chute est bien moindre dans les hypertensions gravidiques. Après l'accouchement, la réaction à l'injection de TEAO dans les hypertensions gravidiques rejoint rapidement celle des grossesses normales et elle coïncide avec la réaction au TEAO au cours de la grossesse normale et celle observée chez des sujets en dehors de la grossesse.

En fait, l'importance de l'étude de Brust et coll.

la gestation normale et toxémique, ils notent dans la grossesse normale une chute progressive à partir de la 18ème-20ème semaine. Dans la toxémie, il s'élève progressivement à partir du 6ème mois. Amadi attribue une valeur diagnostique à ce test.

Les résultats de la rochi-symptomatique sont satisfaisants montrant la grossesse normale lorsque sont constatées des parités. A noter que ce test a mis en évidence le rôle de la phase veineuse dans l'hypotension ainsi crées. Celle-ci peut être prévenue par l'élévation des membres inférieurs.

Les différentes préparations de Veratrum viride agissent sur la tension artérielle mais sans l'intermédiaire du système sympathique. Or, alors que l'injection ne détermine pas de baisse tensionnelle chez la femme saine normale, elle entraîne chez la femme atteinte de pré-éclampsie une diminution notable.

Il en va de même pour l'apressoline qui détermine une chute importante et prolongée de la tension artérielle chez les femmes enceintes toxémiques, poignées chez les hypertendues essaiées, et entraînant même au cours de la grossesse normale.

Les tests effectués sur la tension artérielle pendant la grossesse normale et toxémique ont permis de constater que la tension artérielle normale est maintenue par l'apressoline.

La conclusion de ces travaux est que dans la grossesse normale ou intervenant chez une hypertendue permanente, la résistance périphérique et le système vasculaire qui en est le siège sont déterminés par le système nerveux autonome. Il n'en va pas de même pour l'hypertension de la grossesse gravidique, qui serait due à un facteur humoral, agissant directement sur les parois vasculaires.

5 - LES SUBSTANCES CIRCULANTES

1) La rénine

Depuis les nombreuses expériences de Goldblatt sur l'hypertension artérielle chronique expérimentale, de nombreux auteurs se sont efforcés à découvrir et extraire de l'hypertension gravidique le principe de rénine dans le sérum artériel. Cette recherche a toujours été couronnée de succès.

En effet, si Baxter et Haynes, recherchant la rénine par des méthodes compliquées et coûteuses et en quantité significative chez une malade présentant une éclampsie, chez 2 malades atteintes de pré-éclampsie et une de glomérulo-néphrite aigue maligne avec hypertension, elle était absente dans les deux autres conditions légères et chez les hypertendues permanentes.

Les auteurs américains ont constaté que la rénine est présente dans le sérum artériel des hypertendues permanentes et dans le sérum artériel des hypertendues gravidiques.

Mason, Macleod et Page se proposent de déterminer un syndrome expérimental de l'hypertension gravidique par injection de renine chez le rat, ce en préparant 1° animal par une néphrectomie unilatérale et par l'injection soutenue de doses sub-occlusives associées à un régime hyper-salé. Ces auteurs se placent vraisemblablement dans des conditions optima pour obtenir une hypertension.

Rezzi et al. ont repris leurs expériences et ont confirmé leurs résultats. Ils signalent que l'administration de sodium est présumée par l'administration d'opressoline en même temps que celle de renine.

En définitive, l'influence déterminante de la renine ne semble pas intervenir dans la détermination des hypertensions gravidiques.

2) Les hypertension chroniques expérimentales

Il est bien connu que l'administration chronique de doses élevées de renine provoque une hypertension chez les animaux adultes et lors de la gestation.

Chez les adultes, ils n'observent aucune modification. Par contre, chez les animaux gestants, ils observent une hypertension expérimentale chronique. Cette hypertension est caractérisée par une élévation de la pression artérielle et par une augmentation de la résistance vasculaire. Les auteurs concluent que la renine joue un rôle important dans la détermination des hypertensions chroniques expérimentales.

pas trop longue, entraînant une ischémie utéro-placentaire définitive. Elle disparaît si l'on pratique une hystérectomie.

Van Boodijk-Basch et Mastboom ont repris ces expériences. Ces auteurs partent de l'idée que la pré-eclampsie est due à une ischémie de l'utérus gravid entraînant une circulation insuffisante des espaces intervillositaires.

Chez 8 chiennes gravides, ils pratiquent un clampage aigu des artères utérines, ou de l'ordre sous-rénale. Ils comparent les résultats obtenus avec des expériences semblables chez la chienne en dehors de la gestation.

Chez les témoins, on n'observe pas de modifications tensionnelles. Par contre, chez les animaux gravides, ils constatent une hypertension artérielle qui dure aussi longtemps que la compression artérielle. Cette hypertension se renouvelle chaque fois que le clampage est repris. Elle disparaît après hystérectomie.

Ils en concluent que l'utérus gravid est une substance vaso-pressible, s'appuyant sur la théorie de Dumortier : l'ischémie de tout organe actif et non seulement des reins peut entraîner la production de substances hypertensives.

2) Action des catécholamines sur le système vasculaire préparé par les minéralocorticoïdes (Raub et coll.)

En résumé, ces auteurs ont étudié l'action de

perfusions d'adrénaline ou de nor-adrenaline au cours de la grossesse. Ils ne constataient aucune différence de réactivité aux catecholamines entre une série de nullipares et de femmes enceintes normales.

Par contre, ils étudiaient trois groupes de grossesses anormales représentant l'un sur l'autre: 30 avec ordame, 24 avec albuminurie, et 17 avec hypertension gravidique apparue après le test. Ils trouvent, dans l'ordre précité une réactivité progressive à la perfusion par les catecholamines. Dans les 10 cas où l'hypertension était maxime, il existait une toxémie gravidique où elle se développait ultérieurement.

Ils comparent ces réactions anormales à celles de celles des hommes traités par le desoxy-cortico-stérone et qui sont sensibilisés à l'action des catecholamines. Les minéralo-corticoïdes et les gluco-corticoïdes à un moindre degré favoriseraient l'accumulation de sodium dans les cellules de la musculature lisse des vaisseaux et augmenteraient ainsi l'action de l'adrénaline.

Nous sommes ainsi amenés à nouveau à prendre en considération l'action prédominante de l'aldostérone sur la fixation de sodium intra-cellulaire, peut-être facilitée par un dérivé en progestérone et sensibilisant les parois vasculaires à l'action des catecholamines.

Certes, il ne s'agit là que d'une hypothèse, mais elle est satisfaisante pour l'esprit, prenant place dans les modifications hormonales que nous avons décrites.

Le mécanisme de l'hypertension artérielle au cours de la pré-éclampsie-éclampsie semble donc encore mal élucidé. Le rôle du système sympathique apparaît cependant secondaire, cédant le pas à des hormones circulantes qui agissent directement sur les parois vasculaires. S'agit-il de substance vaso-pressives sécrétées par le placenta du fait de l'ischémie, ou d'une sensibilisation des parois vasculaires aux catécholamines par un déséquilibre entre aldostérone et progesterone entraînant une accumulation sodée intra-cellulaire, il est difficile de l'affirmer. Peut-être les deux facteurs jouent-ils ou peut-être s'agit-il d'un mécanisme entièrement différent.

Cependant même si l'accident décrit est le fait d'une toxémie pure, il ne faut pas méconnaître le rôle favorisant d'une prédisposition du terrain aux accidents hypertensifs.

MECANISME DU SYNDROME TOXEMIQUE

Nous arrivons ainsi au terme de cette longue incursion dans le domaine de l'hypertension gravidique en général, quelque soit son type. Elle va nous permettre de tenter de réaliser une synthèse à propos du mécanisme du syndrome. Nous pensons qu'il est comme aux trois types d'hypertension gravidique dont nous avons parlé dans l'introduction.

Nous passerons maintenant sur certaines hypothèses, pour nous appliquer à des cas tout à fait particuliers mais ne pouvant être généralisées.

Delabard et coll., à propos de 3 cas d'éclampsie avec des troubles hématologiques. Incontestablement ceux-ci; ils décrivent un syndrome comprenant une leucocytose importante, une augmentation du temps de coagulation et une fragilité capillaire. S'agit-il d'une afibrinémie?

La constatation par McKay et coll. de la présence de thrombi fibrineux dans les artères viscérales

chez des femmes atteintes de dystrophie a incité Schneider à tenter de reproduire le syndrome par injection de thromboplastine. En fait, ses expériences sont loin d'être probantes. Page, d'ailleurs, s'élève contre cette interprétation.

L'hypothèse de Selge, qui pense que l'hypertension peut être un syndrome d'adaptation au beaucoup plus séduisant. Manning et Orndorff lui ont donné leur adhésion. Mais elle a surtout été reprise par Parviziou et coll. Ils considèrent la grossesse comme un "stress" prolongé.

Ils insistent sur l'action des sécrétions surrénales, minéralo-corticoïdes et à un moindre degré glucocorticoïdes sur les spasmes artériels. Ils pensent que le syndrome est dû à un dysfonctionnement ou à un hyperfonctionnement surrénalien.

Cette théorie est assez satisfaisante, mais nous avons vu qu'il n'existe pas d'hyperfonctionnement surrénalien au cours de la toxémie gravidique par rapport à la grossesse normale.

Il nous semble que le facteur principal est le dérèglement hormonal et en particulier celui du système progestéro-ne et oestrogène.

Nous proposons à titre d'hypothèse la séquence suivante :

Des lésions placentaires (quelques soient leur origine) entraînent une baisse de la tension artérielle alors que la circulation des quantités normales d'aldostérone. Ainsi s'explique une rétention chlorurée sodique.

L'hypertension artérielle est elle-même due à une substance sécrétée au niveau du placenta (aldostérone) agissant directement sur les artérioles soit du fait d'une sensibilisation des parois vasculaires survenant en réponse à l'action des catécholamines normalement sécrétées. Cette substance agit sur les parois vasculaires par le fait d'une hypersensibilisation de l'aldostérone. Quoiqu'il en soit l'hypertension ainsi créée tend à accentuer les lésions placentaires et à aggraver les troubles hormonaux de l'organisme. Ainsi s'aggrave un cercle vicieux, où les lésions placentaires entraînent la rétention hydro-saline et l'hypertension qui à leur tour aggravent les lésions placentaires. L'on connaît qu'empiriquement, le traitement se soit efforcé de rompre ce cercle infernal par une dépression sodée (régime restrictif) et l'administration d'hypotenseurs (veratrum viride, apessoline).

Mais le placenta n'est pas le seul organe point de départ de l'affection. Une lésion rénale, survenant sur les modifications favorissantes de la grossesse peuvent être à l'origine d'une rétention hydrochlorurée-

Les symptômes de la toxémie sont
caractérisés par une hypertension artérielle
et des modifications de la coagulation du sang.
Ces modifications sont de nature
à favoriser la formation de caillots
dans les vaisseaux sanguins.

En outre, on observe souvent une
anémie, une leucopénie et une
thrombocytopénie. Ces modifications
sont dues à une diminution de la
production de globules rouges et de
plaquettes.

La toxémie est une complication
grave de la grossesse. Elle peut
entraîner la mort de la mère et
du fœtus. Elle est due à une
altération du métabolisme.

Si l'on admet l'unité de mécanisme des toxémies, il est frappant de constater à quel point sont disparates les données relatives à l'étiologie de ces syndromes. On trouve en effet dans notre littérature de nombreux auteurs qui admettent l'existence de conditions pathologiques différentes pouvant entraîner des modifications sanguines identiques. Dans la plupart des cas, nous avons à l'origine plusieurs causes de l'hyperurémie. Nous allons maintenant étudier ces facteurs étiologiques à la lumière des données qui peuvent nous orienter dans les observations, et nous à dire essentiellement les antécédents personnels et héréditaires et divers examens pratiques.

I - L'HYPERTENSION ARTERIELLE PERMANENTE

De nombreux auteurs, Milliez et Fricel en tête, Dieckman pensent que l'HCR est une manifestation de l'hypertension artérielle permanente en puissance. La survenue de la grossesse extérioriserait de façon plus

présente une hypertension permanente qui ne se serait révélée que plus tard en son absence.

Sur nos 19 malades, nous retrouvons dans 3 cas des antécédents familiaux d'hypertension artérielle et 2 cas de mort par insuffisance cardiaque. Nous avons pratiqué 13 fois un cold pressor test. Sur 12 tests faits en dehors de toute grossesse, 3 furent positifs. Sur 3 tests pendant la gestation, un seul se révéla positif. Ainsi dans 1/4 des cas, nous avons trouvé des antécédents héréditaires d'hypertension artérielle permanente, dans 1/3 un " cold pressor test " positif (encore que la valeur de ce test soit diversement appréciée).

Le facteur déterminant à l'origine du syndrome toxémique est l'existence de lésions artériolaires placentaires, due à l'hypertension artérielle incipiente. Ces lésions placentaires entraînent une hypertension par ischémie, aggravant les lésions placentaires et amorçant le syndrome.

Même si la tendance hypertensive est insuffisante pour s'extérioriser hors de la grossesse (tout au moins des premières) l'on conçoit fort bien qu'elle réapparaisse lors de chaque grossesse successive, déterminant l'HGR. Il est tentant de penser que c'est dans ce groupe qu'apparaissent les " séquelles hypertensives " des HGR décrites par certains auteurs.

B - L'INSUFFISANCE RENALE LATENTE

Cette théorie est soutenue par de nombreux auteurs anglo-saxons qui ont créé la larve de "low reserve kidney" (reins de peu de réserves). Ces reins, étant de façon importante seraient tout juste capables de maintenir l'équilibre au cours de la vie normale. Du fait de la surcharge que représente la grossesse (augmentation du volume sanguin, augmentation des besoins excréteurs) les fonctions rénales seraient débordées. Ainsi serait créé un début de rétention chlorurée sodique ayant pour conséquence le déclenchement du syndrome toxémique.

Dans notre série, sur 19 malades nous retrouvons 5 scarlatines dont une avec nephrite scarlatineuse, 3 cas d'angine à étiologie streptococcique avec insuffisance rénale évidente, 2 angines et un cas de maladie de Bouillaud.

Là aussi l'état rénal persistant égal à lui-même ou aggravé par l'impact gestationnel, nous a retrouvés les mêmes conditions dans toutes les gestations.

Ainsi peut s'expliquer l'existence de séquelles rénales dans quelques cas d'EGR alors que les lésions propres de la toxémie sont essentiellement fonctionnelles et regressives si l'affection n'agit pas de façon trop prolongée.

C - LES MALFORMATIONS CONGÉNITALES PURES

1) Les malformations utérines

Il est très possible qu'elles jouent un rôle. Elles peuvent être à l'origine d'un vice d'implantation du placenta, entraînant une mauvaise vascularisation de cet organe et un trouble de la circulation fœtale placentaire.

Nous avons rencontré parmi nos malades un cas de malformation congénitale constatée cliniquement mais que nous n'avons pu vérifier par l'hystérographie. Chez une autre malade, l'hystérographie systématique a mis en évidence un utérus d'aspect légèrement inflexé.

Enfin, signalant les cas de grossesse avec utérus anormal a trouvé dans un cas une torsion gravidique. Cet auteur ne précise pas le type de l'anomalie découverte ni la gravité ni la répétition des troubles à chaque gestation.

Il va de soi cependant que les mêmes conditions se retrouvent à chaque grossesse.

2) Les anomalies de l'artère utérine

Elles n'ont pas été étudiées, du fait de la difficulté de soulever une certaine série de malades de grossesse et de leur état de santé. Pourtant il est intéressant d'observer qu'une artère utérine anormale est souvent associée à une anomalie de l'artère aortique. Lorsque l'artère a atteint le maximum de son débit apparaît une ischémie placentaire entraînant

une hyperproduction hormonale. Ainsi comme nous l'avons vu dans notre série de cas il y a toujours au cours de la grossesse que surviendrait l'hypertension.

III - FACTEURS MECANIQUES ET DYSHARMONIE UTERO-PERIVICINE

Nous pensons qu'ils ont été sous-estimés.

Dans la toxémie gravidique sans lendemain de la première grossesse, un certain nombre de facteurs prédisposants ont été retenus par presque tous les auteurs : la grossesse extrême de jeune matrice, l'importance de volume des produits de conception (grossesse, hydropisie) - Il est bien évident avec l'âge qu'il y a un développement relatif de la circulation utérine ou d'une vasculature utérine trop étroite pour laisser passer des quantités suffisantes de sang. On bien avec Dickson envisager la rôle prépondérant d'une capsule abdominale solide. Tous ces facteurs seraient à l'origine d'une ischémie placentaire. Mais il est également possible de penser et de considérer les dysfonctionnements anatomiques d'un bassin encore peu développé chez ces malades jeunes, en dysharmonie avec le volume utérin. Au cours des grossesses ultérieures, la malade étant plus âgée et ayant déjà eu une grossesse, le bassin est plus développé, les ligaments assouplis par la grossesse précédente (action hormonale et distension mécanique). Aussi, l'apparition du syndrome toxémique est moins au cours d'une grossesse ultérieure. Quoiqu'il en soit, chez ces jeunes ou très jeunes, il y a disproportion entre le con-

D'un autre point de vue, il est curieux de remarquer combien il est difficile de créer un syndrome émuquant la toxémie gravidique chez l'animal d'expérience. D'aucuns sont obligés de recourir à des moyens complexes mettant tout en œuvre pour créer une hypertension (Masson et coll., Renzi et Gaunt). D'autres emploient des moyens simples (Peters et Tarjan, Schneider, Perry Parviainen et coll.) mais n'obtenant que des manifestations ressemblant de très loin à celles de la dystro-
phie. Or une différence majeure entre la femme enceinte et la femelle animale gravide en général est que la femme enceinte maintient pendant toute la grossesse la position debout.

Celle-ci favorise indubitablement un certain nombre de perturbations, car elle entraîne une compres-
sion par l'utérus gravide des conduits traversant le
pelvis:

- les veines: nous avons vu que dans la grossesse nor-
male il existe une augmentation de pression veineuse
dans les membres inférieurs attribuée en partie à la
compression des veines pelviennes par l'utérus et en
partie au déversement des veines utérines à haute pression
dans les veines collectrices pelviennes.

- les urètres: la dilatation et la stase observée dans
les voies excrétrices rénales sont d'origine mécanique,
normale pour certains, anormale pour d'autres.

amplifions vers une pré-éminence de facteur mécanique. Tout d'abord, les lésions anatomiques décrites sur le bas urètre évoquent fortement des altérations dues à une cause mécanique. D'autre part, stase et dilatation sont toujours plus marquées du côté droit, dans la position de l'utérus, moins bonne protection anatomique de l'urètre droit, le gauche étant garanti par le colon. Il prendrait compte de ce fait. Enfin, nous avons vu que certains auteurs ont essayé sans succès de reproduire les modifications urétérales par injection massive de progesterone. De toutes façons, ces modifications entraîneraient une baisse de la filtration glomérulaire, réduisant la rétention sodée.

- Enfin, il est possible que l'utérus gravide, déplaçant le diverticule supérieur, entraîne une compression de la partie inférieure de l'aorte, ou plus probablement une compression des artères urétrales dans le pelvis. L'expérimentation animale reconnaît ce facteur comme cause possible d'ischémie placentaire et de sécrétion de sub-

Il s'agit là de modifications pourtant physiologiques au cours de la grossesse et qui expliquent peut-être dans une certaine mesure l'augmentation de la rétention sodée. La réalité de ce facteur mécanique a été étudiée par Dieckman qui trouve que chez la femme normale comme chez la pré-éclampsique, le retard de l'évacuation d'eau et de sel est maximum dans la position debout, minimum

en position de Trendelenburg. Prischard et coll. ont comparé les effets du passage du déubitus latéral au déubitus dorsal chez 16 femmes enceintes normales ou toxémiques et 2 femmes présentant une grosse tumeur pelvienne. Ils trouvent dans le déubitus dorsal une diminution d'excrétion d'eau et de sel, alors que le flux sanguin rénal et l'excrétion de potassium restent inchangés.

Chez la femme donc, la position decubitus tend à favoriser la compression des organes pelviens. Rien de tel chez l'animal où l'utérus gravide repose sur la cage musculo-abdominale.

Ainsi deux grands facteurs semblent jouer dans la constitution des HGR

- 1) Un facteur de terrain en toute rare, toute disposition congénitale anormale constitue un terrain propice à l'apparition du syndrome.
- 2) Le facteur de la grossesse elle-même qui, par l'effort qu'elle demande au système vasculaire, l'afflux hormonal qu'elle provoque et les compressions qu'elle entraîne, crée le déséquilibre nécessaire à l'apparition du syndrome.

On peut penser que dans certains cas ces troubles seront accentués par une anomalie congénitale entraînant une disharmonie utéro-pelvienne. Une cavité pelvienne trop petite, ou uterus trop gros vont accentuer

la pression sur les organes pelviens; ainsi sera créé tout d'abord une compression du placenta comme nous l'avons décrite au cours de la dysgravidae de la primipare entraînant une ischémie relative du placenta, d'autre part une accentuation des modifications veineuses, artérielles et urétérales que nous avons décrites. Ces conditions ont toutes les chances de se reproduire à chaque grossesse, et à peu près à la même époque de la gestation. Par contre, en dehors de la grossesse, aucune altération pathologique ne se manifeste.

Si ce facteur mécanique n'est pas déterminant dans tous les cas de pré-éclampsie-éclampsie, il est probable qu'il représente un sub-stratum favorisant lorsqu'existe une anomalie préalable latente, vasculaire ou rénale.

Ainsi, des causes vasculaires, rénales, congénitales peuvent être à l'origine de l'HOT. Les causes mécaniques où s'associent l'action de facteurs anatomiques et l'influence de la station debout pourraient, d'après notre hypothèse, être un sub-stratum favorisant à l'action des autres anomalies voire constituer elles seules le point de départ du syndrome.

La multiplicité de ces causes, leur identité avec celles des autres types de toxémie gravidique explique bien la difficulté de leur traitement.

cas clinique de race prévisse dans l'une ou l'autre forme. Les divergences de vue des différents auteurs quant aux séquelles qui peuvent marquer la mère à distance des accidents seraient dues à la diversité des causes déclenchantes. Le syndrome toxique uniquement fonctionnel et transitoire ne laisserait pas de suites en se retirant mais le facteur déclenchant responsable porterait sa marque personnelle précoce ou tardive; hypertension artérielle permanente ou déficit rénal résiduel.

CONCLUSION

L'étude et l'analyse de nos 19 cas d'HCR nous a permis de dégager un tableau clinique précis de l'affection.

Jointe aux nombreux tableaux cliniques, biologiques, anatomo-pathologiques et expérimentaux que nous avons trouvés dans la littérature, elle a rendu possible l'élaboration d'un schéma unique pour tous les cas.

Le premier noyau paraît le plus souvent être l'origine de lésions disséminées du type technique, entraînant un déficit de production des hormones sécrétées par cet organe. Ce déficit crée un déséquilibre avec les hormones surrénaliennes, et en particulier l'aldostérone, sécrétée de façon normale par des surrénales saines. Cette dysharmonie hormonale entraîne une rétention hydrochlorosodique et favorise peut-être la fixation du sodium dans les cellules des muscles lisses des vaisseaux. Les artères sont ainsi sensibilisées à l'action des anseux, ce qui

d'un spasme artériel et hypertension. L'hypertension artérielle ainsi créée tend à aggraver à son tour les lésions placentaires amenant un cercle vicieux. Les lésions rénales et hépatiques semblent plus une conséquence de l'HGR que son point de départ. Cependant dans certains cas, l'on peut concevoir qu'une insuffisance rénale soit le point de départ d'une réaction hydro-électrolytique sodique, ou qu'un trouble de la fonction hépatique entraîne une altération du métabolisme hormonal.

Cette hypothèse, bien que basée sur des études et des expériences variées, est en partie le reflet de notre opinion personnelle. Il reste que cette tentative d'unification rend compte de façon satisfaisante pour l'esprit des faits observés.

Si le mécanisme nous semble univoque, les facteurs qui le mettent en branle sont multiples, d'après l'analyse des antécédents personnels et familiaux de nos malades, les différents examens que nous avons pratiqués et l'opinion des divers auteurs. Hypertension artérielle permanente insidieuse, anomalies de l'utérus ou de l'artère utérine, dysharmonie urogénitale peuvent être à l'origine des lésions placentaires. Insuffisance rénale en puissance, compression urétérale accentuée au-delà de la normale par un utérus trop gros dans une cavité pelvienne trop étroite, etc.

amener une rétention hydropurée-sodique. Il est le plus souvent impossible, dans l'état actuel de nos connaissances de mettre en lumière le facteur précis à l'origine du syndrome: il est d'ailleurs probable qu'ils s'associent de diverses façons dans bon nombre de cas. Il reste que deux éléments majeurs sont en jeu: le terrain, porteur d'une tare probable ou de dispositions anatomiques congénitalement anormales, et la grossesse, initiatrice des perturbations.

L'HGR, considérée sous cet angle est bien, ainsi que nous l'avons dit dans notre introduction, le trait d'union entre l'hypertension gravidique sans lendemain de la primipare et la toxémie gravidique survenant chez une malade antérieurement tarée. L'intérêt de cette étude a été de regrouper le syndrome d'hypertension gravidique en un mécanisme unique qui peut s'appliquer à tous les types, mais dont la mise en oeuvre et la cause première sont différentes selon les cas.

VU

et Permís d'imprimer

LE RECTEUR

de l'Académie de Paris

Jean SARRAILH

VU

LE DOYEN

de la Faculté de Médecine de Paris

Léon BINET

Président de thèse: Monsieur le Professeur

PASTEUR VALLERY RADOT

Signé

PASTEUR VALLERY RADOT

1- Abstracts

Abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

2- Abstracts - 1964-1965 - Volume 1

Abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

3- Abstracts - 1964-1965 - Volume 2

Abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

4- Abstracts - 1964-1965 - Volume 3

Abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

The abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

The abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

The abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

The abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

The abstracts of papers presented at the 1964-1965 Annual Meeting of the American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry, held in New York City, N.Y., September 28-October 3, 1964.

- 10- ASSALI N.S. - SUMMERS R.
Studies of hormones in pregnancy: effects of ACTH on the hemodynamic and the excretion of electrolytes in normal pregnant women.
Met. Clin. and Exper. 3-303-1954.
- 11- ASSALI N.S. - MOORE A. - OLIVIERE E. - VIGORINI G. - LINDEN R.P.
Effects of limitation of renal carbonic anhydrase by Diamox in normal and toxemic pregnancy.
I. Lab. and Clin. Med. 45-71301955
- 12- ASSALI N.S. - VERGAS I.M. - YADA Y. - SUMNER S.V.
Studies on salivary diode IV. The mechanism regulating the hemodynamic changes in the pregnant woman and their relations to the hypervolemia of toxemia of pregnancy.
Am.J. Obst. Gyn. 63-978-1952
- 13- AUBERT J. - CHARENTY E. - GRUYER R.
Les troubles de l'alimentation au cours de la gestation normale.
Rev. Lyonnaise de Med. 4-467-1955
- 14- AUSTIN D. - FRYMIRE L.
Pregnancy following the Smithwick operation for hypertension
Am.J. Obst. Gyn 56-803-1948
- 15- BAIRD W.M. - ASSALI N.S.
Use of low molecular weight preparations in the treatment of toxemia of pregnancy
Am.J. Obst. Gyn 72-1093-1951
- 16- BAIRD D. - DIEN J.S.
Renal lesions in eclampsia and nephritis of pregnancy
J. Path. Bacter. 47-231-1953
- 17- BAIRD J.F. - BARNES J.J. - CLARK R.H.A. - DRYER W.E. Jr.
The use of a cation exchange resin in the control of edema and excessive weight gain in pre-natal patients
Am.J. Obst. Gyn 61-149-1951
- 18- BARNES J. - BARNES J.J.
Blood pressure and the incidence of hypertension in multiparous and primiparae women in relation to the remote prognosis of the toxemia of pregnancy
J. Obst. Gyn. of Brit. Emp. 52-1-1945.
- 19- BAIRD D.
Blood pressure of relatives of patients with toxemia of late pregnancy
J. Obst. Gyn. of Brit. Empire 52-550-1945
- 20- BAIRD D. - ASSALI N.S. - VERGAS I.M. - YADA Y. - SUMNER S.V.
Studies on salivary diode IV. The mechanism regulating the hemodynamic changes in the pregnant woman and their relations to the hypervolemia of toxemia of pregnancy.
Am.J. Obst. Gyn. 63-978-1952

21- WATKINS P. F. JAYLE EF

Thrombotic and embolic phenomena associated with the
use of oral contraceptives.

Compte rendu des séances de l'Acad. des sciences 2418-2417-1964

22- BAULIEU EF

Communication personnelle.

23- BAYLESS R.I.B. BROWN JC RYAN B.F. STEINER AN

Plasma 17 hydroxy steroids in pregnancy

Lancet 1.62-1955

24- BELL BT

Renal lesions in the toxemias of pregnancy

Am.J. Path. 8-1-1932

25- HENYAKHLEF A.

Les hypertension gravidiques récidivantes

Thèse Paris 1953.

26- BLAND PB BERNSTEIN M

Salicylate in the treatment of pre-eclampsia toxemia

Am.J. Med. 34. 173-344-1967

27- BONSNES RW LANGE WA

Insulin clearance during pregnancy

Federation proceed. 9-136-1950

28- BOUTROY R

De l'action de la sympathectomie dorso-lombaire sur l'évolution de la grossesse chez les hypertendues permanentes

Thèse Paris 1950

29- BRET J. CAVAGNA J

Etude clinique des phénomènes gestuels et obstétricaux chez les hypertendues

Gyn. et Obst. 47-702-1968

30- BROWN F.J. DODDS GH

Pregnancy in patients with chronic hypertension

J. Obst. Gyn. Brit. Emp. 49-1-1962

31- Idem

The remote prognosis of toxemia of pregnancy

Idem 46-443-1939

32- BROWN JJ SHEUMACK DE

Chronic hypertension following pre-eclampsia toxemia: the influence of familial hypertension on its evolution.

Idem 63-677-1956

33- BRUST AA ASSALI NS FERRIS FB

Evaluation of neurogenic and hormonal factors in blood pressure maintenance in normal and toxemic pregnancy using tetra-ethyl-ammonium

J. Clin. Invest. 77-737-1968

34- BRYAND GE TORPIN R

A following up study of 243 cases of eclampsia for an average of 12 years.

Am.J. Obst. Gyn 58-1054-1949

35- DURNELL OS STRAYHORN WD FLICJINGER D CORLETTE MB
BOWERMAN RF KENNEDY JA

Circulation during pregnancy

Arch. Int. Med 62-9789-1938

36- BURTHIAULT R BETROUX R.

Les éliminations hormonales chez les femmes enceintes atteintes de nephro-gravidique

J. Med. Lyon 37-887-1956

37- BURTHIAULT R. DUMONT N

Etude de l'élimination urinaire du pregnandiol dans les phropathies gravidiques

Idem 33-71-1952

38- BUTLER AM

Chronic dysmenorrhea and arterial hypertension

J. Clin. Invest 16-889- 1937

39- CAREY HM

The treatment of pre-eclamptic oedema with ion exchange resins. Preliminary Report

J. Obst. Gyn Brit. Emp 59-67-1952

40- CHARRE C

Coutrôle de l'élimination de l'élimination urinaire du pregnandiol au cours de la grossesse normale

Thèse Lyon 1949-50

41- CHART JJ SHIPLEY GORDON ES

Evidence for a sodium retaining factor in toxemia of pregnancy

Proc. Soc. Experim. Biol and Med, 78-244-1951

42- CHARVET F GRUYSSSEL R JOURNET C AUBERT F

Les épreuves de minéralisation au cours des dysgravidies

Rev. Lyonnaise de Med 4-477-1955

43- CHARVILLAT L. AUBERT F. GRUYSSSEL R. CHARVET F.

L'électrolyse des problèmes de bilan au cours de la grossesse chez les femmes atteintes d'une dysgravidie ou une maladie rénale ou métabolique associée à la gestation (64 obs)

Rev. Lyonnaise de Med 4-493-1955

44- CHARVILLAT L. BLANC P. GRUYSSSEL R. CHARVET F.

L'électrolyse des problèmes de bilan au cours de la gestation normale

Thèse 1957-1958

15- CHESLEY LC 1900 JM

Changes in extra-cellular water at delivery and in the puerperium

Surg. Gyn. Obst. 77-201-1943

16- CHESLEY LC

Renal function tests in the differentiation of Bright's disease from so-called specific toxemia of pregnancy.

Surg. Gyn. Obst. 67-481-1948

17- CHESLEY LC

Multaneous renal clearance of urea and uric acid in the differential diagnosis of late toxemia.

Am. J. Obst. Gyn 59-960-1950

18- CHESLEY LC

Weight changes and water balance in normal and toxic pregnancy

Idem 48-565-1944

19- CHESLEY LC

Certain laboratory findings and interpretations in eclampsia

Idem 38-43-1939

20- CHESLEY LC

The question of glomerular damage following toxemia of pregnancy. Idem 42-229-1941

21- CHESLEY LC

Kidney function in the normal and toxic pregnant woman

Med. Clinics of North America 31-699-1951

22- CHESLEY LC ANNITTO JE

Study of salt restriction and of fluid intake in prophylaxis against pre-eclampsia in patients with water retention

Am. J. Obst. Gyn 45-961-1943

23- CHESLEY LC ANNITTO JE JARVIS DO

Study of interrelation of pregnancy and hypertensive disease

Idem 53-851-1947

24- CHESLEY LC CONNELL EJ CHESLEY ER KATZ JD GLISSON CS

The diuretic electrode and renal blood-flow in toxemias of pregnancy - J. Clin. Invest. 19-219-1940

25- CHESLEY LC CHESLEY ER

Extra-cellular water in late pregnancy and its relation to the development of toxemia.

Am. J. Obst. Gyn 42-976-1941

26- CHESLEY LC CHESLEY ER

An analysis of some factors associated with the development of pre-eclampsia. With special reference to extra-cellular water measurement in 1,388 patients.

Idem 45-746-1943.

27- CHESLEY LC WILLIAMS LO

renal glomerular function is retained in the hyper-
tension of pre-eclampsia and eclampsia
Idem 30-157-1943

18. CLAYTON S. ORAM S.

Pre-eclamptic toxemia. In "Medical disorders during pregnancy"
Churchill Ed. Londres 1951

19. CORCORAN A. PAGE I.

Renal function in late toxemia of pregnancy
Am. J. Med. Sc. 201-207-1941

20. DE COUROY C. GRAY CH. LITMAN JR.

Fetal cortisol hormones in human placenta
Nature 170-494-1952

21. COX L. CHAMBERS T.

The effect of pre-eclamptic toxemia on the exchange of sodium
in the body and the transfer of sodium across the placenta
measured by ^{22}Na method.
J. Obst. Gyn. Brit. Emp 60-214-1953

22. COX L. CHAMBERS T.

Transfer of sodium between the human placenta determined by
 ^{22}Na tracer methods.
Idem 60-203-1953

23. COX L. CHAMBERS T.

The exchange of sodium between plasma and extra cellular
compartment in pregnant women as determined by ^{22}Na tracer
methods.
Idem 60-197-1953

24. COX L. CHAMBERS T.

The transfer of sodium to the amniotic fluid in normal and
abnormal cases, determined by ^{22}Na tracer methods.
Idem 60-201-1953

25. COX L. CHAMBERS T.

The transfer of sodium to the placental fluid during the
third stage of labour determined by ^{22}Na tracer methods.
Idem 60-202-1953

26. COX L. CHAMBERS T.

The transfer of sodium to the placental fluid during the
third stage of labour determined by ^{22}Na tracer methods.
Idem 60-202-1953

27. COX L. CHAMBERS T. JOHNSON P. JOHNSON P.

The transfer of sodium to the placental fluid during the
third stage of labour determined by ^{22}Na tracer methods.
Idem 60-202-1953

70- DUFFIN E

The effect of maternal plasma volume expansion on fetal growth during the second half of pregnancy

Brit. Med. J. 2: 178-187

70- DUFFIN M, PLATT R

The effect of corticosteroids on fetal and adrenocortical rates during pregnancy.

Endocrinology 54-384-1956

71- DEWEZ P

Evolution des hypertensiones aggraves en fin de grossesse, Analyse de 11 observations recueillies à la clinique Obstétricale

Thèse Lyon 1953.

72- DEXTER L, HINES W

Relations of renal to human hypertension with particular reference to eclampsia, pre-eclampsia and acute glomerulo-nephritis.

Proc. Soc. Exper. Biol and Med. 15-282-1944

73- DIECKMAN WJ

The toxemias of pregnancy

Mosby and Co. St. Louis 1952

74- DIECKMAN W.J.

Effect and plasma volume changes in eclampsia

Am. J. Obst. Gyn 32-927-1956

75- DIECKMAN WJ, BROWN I

The obstetric management of toxemia with toxemia

Idem 38-214-1959

76- DIECKMAN WJ et coll.

Etiology of pre-eclampsia-eclampsia, I water balance

Idem 68-1014-1949

77- DIECKMAN WJ ET KRAMER S

Edema in pre-eclampsia and eclampsia

Idem 41-1-1941

78- DIECKMAN W.J. et coll.

Etiology of pre-eclampsia-eclampsia. III: the effect of oral ingestion of sodium chloride and sodium bicarbonate by patients with toxemia of pregnancy.

Idem 61-1100-1951

79- DIECKMAN et coll.

Pre-eclampsia-eclampsia does not cause vestibulo-ocular disease

Idem 61-85-1952

80- DIECKMAN WJ et coll

Etiology of pre-eclampsia-eclampsia IV. sodium chloride test for the diagnosis of pre-eclampsia

Idem 63-763-1952

80- DILL IV, LEBEROUR CE, CALLEN JF, SCHAUER HK
Gestational hypertension and renal blood flow in the toxemia
of pregnancy.
Idem 19-12-1967

81- DILL IV, LEBEROUR CE, CALLEN JF, SCHAUER HK
Gestational hypertension and renal blood flow in the toxemia
of pregnancy.
Idem 19-12-1967

82- DOCK W, FRANKER ER
Gestational hypertension: early onset and severity as related to the manage-
ment of cases.
Am. Heart J. 6-6-8 19-0

83- FENION AN, SINCH PE
Pregnancy associated with congenital abnormalities of the
female reproductive tract.
Am. J. Obst. Gyn. 19-12-1967

84- FINNERTY FA Jr.
Onset of hypertension-preeclampsia: associated with the development
of hypertension appearing early in pregnancy.
Am. J. Med. Sc. 231-110-1976

85- FINNERTY FA Jr.
Hypertensive toxemia of pregnancy: A simplified method of
management using purified extracts of Veratrum viride.
New Engl. J. Med. 246-616-1952

86- FINNERTY FA Jr.
Nephropathy masquerading as toxemia of pregnancy.
JAMA 161-210-1950

87- FINNERTY FA Jr.
Toxemia of pregnancy as seen by an internist in a medical
of 1081 patients.
Ann. Int. Med. 44-358-1950

88- FREIS ED, KENNY JV
Plasma volume, total circulating protein and "available
fluid" abnormalities in pre-eclampsia and toxemia.
J. Clin. Invest. 27-283-1949

89- FREIS ED et al.
The hemodynamic effects of hypotensive drugs in man - I -
Veratrum viride.
J. Clin. Invest. 28-353-1949

90- FRITEL D
Rôle du rein dans la déclenchement des complications hyper-
tensives de la grossesse.
Bull. Med. 62-53-1950

91- FRITEL D.
Travaux des néphrologues américains. 1949-1950-1951

92- WILLIAMS D
Effect of β stimulation on the hypotension of pregnancy
Trans. Obst. Gyn. 1956

93- WILLIAMS D
Control of renal deviant use hypertension chez femme enceinte
Wk. Med. 77-1721-1956

94- HARRISON V SCHWARTZ IL LEVITT ME
Fetal weight & distribution as a measure of extra-cellular
fluid in dog & in man
Proc. Roy. Soc. Med. 48-907-1955

95- CHURCHILL DA
Effect of 11-hydro-cortisone on the normal pregnancy
J. Clin. Invest. and Endocrinol 13-846-1953

96- BRIDGES HA STANT JJ HAGEDORN D SHIPLEY E
Mechanism of sodium retention in pre-eclamptic toxemia
Obst. and Gyn 4-39-1954

97- COLEMAN JH
Hemoglobin in eclampsia J. Obst. and Gyn 17-311-1952

98- STANT JJ CHURCHILL DA
The variation of sodium space and the total exchangeable so-
dium during pregnancy. J. Clin. Invest 32-313-1953

100- HARRISON VJ VAN NICK HB
Researches on the toxemia of later pregnancy
Am. J. Obst & Gyn 24-820-1932

101- WILLIAMS D
Structure and function of ureter during pregnancy
J. Urology 20-133-1928

102- JAYLER JW
Adrenal function and the effect of ACTH during pregnancy
Proc 2nd Clin. Acth confer. Philadelphia, Pa. 1951
page 77

103- JAYDER JA KNOWLTON AT
Stimulated adrenocortical activity during pregnancy in an
addisonian patient- J. Clin. Invest 29-1430-1950

104- JAYLE MF HEAULIEU EE
Etude de l'aldosterone
Rap. de Travaux Reunions des Endo de Langue Fr. Mars 1957 p. 1

105- JOHNSON RH HAINES JI
Extraction of adrenal cortex activity from placental tissue
Science 115-434-1952

106- JOHNSON T CLAYTON CG
Distribution of radioactive sodium in normotensive and pre-
eclamptic pregnancies - Brit. Med. J 1-311-1957

107- EDWARDS JR. R. L.
Observations on the volume of the extra-uterine fluid of
the body with radio-active sodium
J. Exper. Med. 74-47-1913

108- VARICOSE IN PREGNANT
Observations on pregnancy and the female-internal circulation system
Ann. Soc. Exper. Biol. and Med. 52-245-1963

109- KELLOGG F.
Pregnancy following lumbosacral-splenectomy in toxemia
of pregnancy - Clinica 4-941-1943

110- YENNY HA. LAMBERT OF WILKINSON
Hemodynamic changes in the elderly in late toxemia of pregnancy
J. Obst. Gyn. Brit. Emp. 57-47-1960

111- KITCHEMER JR. CHARLES H.
Surgical treatment of toxemia with pregnancy
JAMA 142-1333-1945

112- CHOLEAU R.
L'infarction gravidique-récidivante
Gaz. Med. de France 55-547-1948

113- CHOLEAU R.
Sur les causes vasculaires récurrentes dans les hypertensions
gravidiques - Gaz. Med. France 58-367-1951

114- CHOLEAU R.
L'infarction vasculo-rénale chronique pendant la
grossesse. Ann 53-375-1951

115- CHOLEAU R.
Sur les infarctus rétro-ombilicaux à l'apparition gravidique
de ces que les maladies vasculo-rénales
76 n 58-583-1951

116- FRANK G. ACETON BE.
The pharmacology of the rum alkaloids
Physiol. Rev. 20-383-1940

117- LAMBIOTTE C. BLANCARD E. CRAFT S.
In utero clearance in pregnancy
C. C. In. Javess. 29-1707-1953

118- LEPPER H.
Les altérations des néphropathies, les pré-éclampsies et
les éclampsies gravidiques et leur évolution de 1928 à 1947
Gynaecologie 126-511-1947

119- LEPPER H.
L'infarction rétro-ombilicale et son rôle dans la toxémie
de la grossesse
Gynaecologie 126-511-1947



120- LEVINE J

121- LEVINE J

122- LEVINE J

Observations on the effects of a diet and various preparations
J. Clin. Invest. 21-22-1952

123- LEVINE J

Observations on the effects of a diet and various preparations
rabbit model - rat model and HCA
J. Exper. Med. 81-257-1947

124- MARTIN JD

Observations on the effects of a diet and various preparations
Brit. Med. J. 2-371-1950

125- MARTIN KD

Contributions to the study of the effects of a diet and various preparations
les femmes enceintes - These Paris 1950

126- HARRIS DE, LEVINE J, CORCORAN AC, PAGE IH

Effect of various preparations on a rabbit model of pregnancy
J. Clin. Invest. 30-300-1951

127- HARRIS DE, CORCORAN AC, PAGE IH

Experimental production of a rabbit model resembling toxemia of pregnancy
J. Lab. and Clin. Med. 38-223-1951

128- MC KAY DG et coll.

Pathologic anatomy of eclampsia. bilateral renal cortical
necrosis, pituitary necrosis and other renal and placental
changes of pregnancy, and its possible relationship to generalized
Schwartzman phenomenon
Am. J. Obst. Gyn 66- 507- 1951

129- MC KELVEY JB, MACMURDO ST

Study of lesions in the vascular system of fetal cases of
chronic nephritis with toxemia of pregnancy. Malignant nephro-
sclerosis
Surg. Gyn. Obst 60-1-1935

130- WEILMAN E, KHAYIM O

Clinical studies on verstrum alacida - I- the action of
Propranolol and Verapamil in hypertension,
Circulation 1-204-1950

131- MILLIEZ P

Les hypertensions gravidiques
J. Med. Paris 30-109-1947

132- MILLIEZ P

Les hypertensions de la grossesse
Acquisition médicale Association Française 1948 P. 31

132- MILLIEZ P.

Les troubles circulatoires du système artériel au cours de la grossesse.

J. Med. et Chirug 140-221-1919

133- MILLIEZ P.

Conseils aux femmes en traitement hormonal en relation avec les accidents de la grossesse.

Acquisitions Med. Recentes 277-1940

134- MILLIEZ P.

Traitement des troubles endocriniens au cours de la grossesse et de leurs conséquences.

Acquisitions Med. Recentes 176-1942

135- MILLIEZ P.

Néphropathies gravidiques.

Enceyl. Med. Chirug 180-2-1944

136- MILLIEZ P. FRITEL D.

L'avenir postérieur des femmes hypertendues ayant subi une sympathectomie thoraco-lombaire.

Pres. Med. 61-227-1943

137- MILLIEZ P. FRITEL D.

Les éliminations non azotées au cours des toxémies gravidiques. Gynec. et Obst. 93-112-1944

138- MILLIEZ P. FRITEL D.

L'effortement chez les hypertendues permanentes au cours des toxémies gravidiques de type toxémique hypertensive.

Sem. Hop. Paris 31-130-1945

139- MILLIEZ P. FRITEL D.

Les albuminuries de la grossesse.

Rev. Prat 6-509-1946

140- MILLIEZ P. FRITEL D.

Les facteurs physiologiques prédisposants aux complications hypertensives de la grossesse.

Sem. Hop. Paris 27-163-1947

141- MILLIEZ P. FRITEL D. BENTANIEF A.

L'hypertension gravidique récidivante.

Sem. Hop. Paris 29-102-1948

142- MILLIEZ P. FRITEL D. BONHIS A.

Les complications hypertensives au cours de la grossesse.

J. d'Urol 62-512-1948

143- MILLIEZ P. FRITEL D. KOLLOU S.

Les toxémies gravidiques et la néphrologie au cours de la grossesse.

145- MILLER P. FRITEL D. MAILLAT F

Les hypertension gravidiques. Rapport clinique de l'Etat des
travaux sur les résultats des données biomécaniques.
Proc. of 11th Intern. Congr. of Physiol. (New York, 1951)
Almkvist et Wiksell E 1956 p. 92

146- MOKHERJEE R

Effect of bladder distension on arterial blood pressure and
renal circulation in acute spinal cats
J. of Physiol 138-300-1957

147- MULLER AT MACH RS

Parasitologie des animaux de laboratoire
Rapp. IVème reunion des End. de langue Fr. Masson 1947 P. 24

148- NEKKEN H.

25 observations d'hypertension élevée apparues ou aggravées
au cours du 3ème trimestre de la gestation
Thèse Lyon 1955

149- NEWELL JL SMITHWICK RH

Pregnancy following oophorectomy
New England J. Med. 236-851-1947

150- NICE M

Kidney function during normal pregnancy - I - The increased
urea clearance of normal pregnancy.
J. Clin. Invest. 14-575-1935

151- OBER WE et coll

Renal lesions and acute renal failure in pregnancy
Am. J. Med. 21-781-1956

152- ODELL LD ET COLL.

Exchange resins and toxemia of pregnancy: a preliminary study
Am. J. Obst. Gyn 62-121-1951

153- OGDEN E HILDEBRAND GJ PAGE EW

Time of blood pressure during ischemia of the gravid uterus
Proc. Soc. Exp. Biol and Med. 43-49-1940

154- ORLOFF J. WELT L. STONEK L

The effects of concentrated sodium chloride solution on
hollism and excretion of water and electrolytes in nephrosis
and toxemia of pregnancy
J. Clin. Invest. 239-770-1950

155- ORDMAN B.

Pregnancy in the elderly: a study of the effects of age on
the course of pregnancy. S. Clin. Med. 41-1-1956

156- PAGE JW

The effects of the placenta on the circulation of the
mother and fetus. J. Clin. Invest. 23-1-1954

157- PAGE EW

The relation of his albumin in pregnancy
Am. J. Obst. Gyn 51 270-1946

158- PAGE EW ET COLL

Influence of normal and toxemic pregnancy upon renal
clearance of inulin and histidine
Am. J. Med 15-418-1953

159- PAGE EW ET COLL

Physiology of hypertension in eclampsia
Am. J. Obst. Gyn 38 230-1939

160- PARKER HT ROBERTS LW

Interventions with in the management of toxemia of pregnancy
Idem 48-440-1952

161- PARRY HS TAYLOR WH

Renal clearance of creatinine and urea during pregnancy in
normal pregnancy and toxemia of pregnancy in the sheep.
J. of Physic 127-54 P. 1955

162- PARRY HS

Induction of toxemia of pregnancy in sheep
Idem 126-40 P-1954

163- PARVIAINEN S SOIVA K EHRNROOTH CA

On the aetiology of eclampsia with special reference to adrenal
cortical hormones
Ann. Chir. et Gyn. Fenniae/suppl. 1/39-1-1950

164- PARVIAINEN S

Reflexions sur l'etiology de la toxemiegrossesse sur la base
des variations de frequences deur les cas de grossesses
simples, gemellaires ou triples.
Act. Obst. Gyn Scandina. 25 (suppl. 11) 128-1945

165- PARVIAINEN S SOIVA K EHRNROOTH CA

The toxemia of late pregnancy and the theory as to the
syndrom of general adaptation
Act. Obst. Gyn Scandina. 29-186-1949

166- PARVIAINEN S SOIVA K EHRNROOTH CA


Na and K content of erythrocytes and blood plasma in toxemia
of late pregnancy
Cynaecologia 131-233-1951

167- PARVIAINEN S TARNANEN TO

The incidence of eclampsia in Finland during the years 1936
1948 with particular view to effect of weather upon it.
Act. Obst. et Gyn Scand. 29-31-1949

168- PARVIAINEN S SOIVA K VARTIAINEN S

Cortical steroid secretion during pregnancy especially in toxemia
of late pregnancy. Idem 29 1 suppl 71 1-1950



170- PIET J. BERG BASSETT
Toxemia super imposed upon pre-eclamptic hypertension
treated by splanchicectomy
Surg Gyn. Obst 86-673-1948

171- PENNYMAN WP
Use of various estrogens resins in the management of fluids
retention of normal and abnormal pregnancies: Preliminary
report. Am. J. of Med. Sc 222-193-1951

172- PETERI L. TARJAN G
Recherche expérimentale sur l'étiologie de l'éclampsie
Gyn. 129-350-1940

173- PIGEAUD H
Dépistage et surveillance des néphropathies gravidiques
moyens cliniques, études des protéines, dosages urémiques
Gynaecologia 132-146-1951

174- PIGEAUD H. BURTHIAUD R
Accouchement prévenu dans les néphropathies gravidiques
complément d'indications tourées par le taux de protéinurie
et celui de la prégnandiolurie
IVème cong. int. des Sc de Gyn Obst. de langue F. Mai 1952
P. 520

175- PIGEAUD H
Traitement de l'hypertension artérielle au III^e trimestre.
Thérapeutique médicamenteuse et cure de sommeil.
Concours Med. 78-3731-1956

176- PIGEAUD H. BURTHIAUD R. BETHOUX R
Valeur clinique de l'étude de la prégnandiolurie au cours de
certains états pathologiques de la grossesse.
Ann. Endocrin. 14-827-1953

177- PIGEAUD H. BURTHIAUD R. BETHOUX R
Prégnandiol urinaire et troubles de la perméabilité rénale.
Etude portant sur 25 cas de néphrite chronique compliquée
de grossesse.
Gyn et Obst 53-41-1954

178- PIGEAUD H. BURTHIAUD R. GARNIER H
Etude de l'élimination urinaire du prégnandiol dans 23 cas
de néphropathies gravidiques.
Bull. Assoc. Gyn Obst 2-361-1950

179- PIGEAUD H. BURTHIAUD R. CHARRIERE H
Dosage comparé des oestrogènes, du prégnandiol et des xéno-
coides au cours de 10 grossesses normales
Bull. Fed. Soc Gyn Obst 6-499-1952

180- FOUCAUD H. DUTHILLAND R. TARDU J.
30 ans de mort de toxémie du 2^e trimestre. Etude critique de l'eau
de la pregnandiolurie
Idem 4-734-1952

181- FIGSAUD H. DUMONT M. CHARVET F.
Syndrome pathologique spécifiquement gravidique du 3^e trimestre
de la gestation: étude physio-pathologique
Idem 7-271-1953

182- PILLAK E ET COLL
Serum renal function in toxemias of pregnancy
J. Clin. Invest 36-920-1957

183- POLLAK E ET COLL
Reversible glomerular lesions in toxemias of pregnancy.
Lancet 171-59-1956

184- PORGE JE
Conduite à tenir devant une grossesse survenant au cours d'
une néphropathie
Sem. Hop. Paris 32-859-1956

185- PRESTON WF. BOHM EM. DURHAM JR.
The electrocardiograph, electrolytes in toxemia of pregnancy.
Excerpta Medica 7-55-1954

186- PRITCHARD JA. BARNES AC. BRIGHT EH.
The effect of the supine position on the renal function in
the near term pregnant woman
J. Clin. Invest 34-777-1955

187- PRITCHARD JA ET COLL
Intra-vascular hemolysis, thrombocytopenia, and other hematologic
abnormalities associated with toxemias of pregnancy.
New Engl. J. Med 250-89-1954.

188- RAAB W. ET COLL
Vascular reactivity and electrolytes in normal and toxemic
pregnancy
J. Clin. Endocrinol. and Metabol 16-1196-1956

189- RAVAULT P. PONT M. CHASTAGNON G.
Les néphroses hypertensives d'origine gravidique
Rev. Med. Suisse romande 69-738-1949

190- RAVAULT P. PONT M. CHASTAGNON G.
Du rôle des néphropathies gravidiques dans la genèse des
néphrogestoses hypertensives.
J. Med. Lyon 30-261-1949

191- REID DE. TREL RM.
Non convulsive pregnancy toxemia. Their relationship to
chronic vascular and renal disease
Am J. Obst. Gyn 37-886-1939

192- WINTERBERG H
Hypertension and related syndromes: "Ober" syndrome and related aspects of water metabolism
Am. J. Physiol 173-913-1953

193- WINTERBERG H
Etiologie gravidique et hypertension arterielle premenstruelle
Thèse Paris 1949

194- RUSSELL KP MAHARRY MD STEELY JW
Amniotic embolism as an obstetric complication
JAMA 157-15-1955

195- BAPIR M ET COLL
Traitement et surveillance des nephropathies gravidiques
Med. Francis 9-237-1949

196- SCHAFER HK DILL LV CADDEN JF
Uric acid clearance in normal pregnancy and pre-eclampsia
J. Clin. Invest 22-201-1943

197- SCHNEIDER CL
Complications of late pregnancy in rabbits induced by experimental placental trauma
Surg. Gyn. Obst 90-613-1950

198- SCHNEIDER DH EIGENER E GORDON MB
Attempt at production of hydronephrosis of pregnancy artificially induced
Am. J. Obst. Gyn 65-660-1953


199- SCHNEIDER FO ET COLL
Toxemia of pregnancy as an etiological factor in hypertensive vascular disease
JAMA 159-105-1955

200- SEITCHIK J
Observations on the renal tubular reabsorption of uric acid I- Normal pregnancy and abnormal pregnancy with and without pre-eclampsia.
Am. J. Obst. Gyn 65-981-1953

201- SELYE H
The general adaptation syndrome and the disease of adaptation
Am. J. Med 10-549-1951

202- SELYE H. BASSETT L
Diuretic effects of progesterone
Proc. Soc. Experi. Biol Med 44-502-1940

203- RENECHAL JJ et coll.
Traitement d'une hypertension arterielle juvenile grave par un extrait de Rauwolfia serpentina et poursuite d'une grossesse à terme.
Sem. Hop. Paris 32-1184-1956



201- STANLEY J. GORDON
The relationship of toxemia of pregnancy
Am. J. Obst. Gyn 32-622-1946

202- STILLER
Pathological lesions in the hypertensive toxemias of pregnancy.
In "Toxemia of pregnancy" Ciba Foundation symposium
Philadelphia 1950 The Blackiston Co.

203- STRAUSS MD
Toxemia of pregnancy; types, aetiology and treatment
Am. J. Obst. Gyn 38-199-1939

204- TAYLOR RC WARNER R WEISS CA
The relationship of oestrogen and other placental hormones
to sodium and potassium balance at the end of pregnancy and
in the puerperium
Idem 38-748-1939

205- TAYLOR RC WARNER R WEISS CA
The relationship of the oestrogens and progesterone to the
edema of normal and toxemic pregnancy.
Idem 45-547-1943

206- TENNEY B
Hypertension in pregnancy
New Engl. J. Med 249-1108-1953

207- THEOBALD GW
The relationship of the albuminuria of pregnancy to chronic
nephritis
Lancet 1-626-1933


208- THORN CW ENGEL LL
The effect of sex hormones on the renal excretion of electrolytes.
J. Exper. Med 68-299-1938

209- TILLMAN AJD
Toxemias of pregnancy
Med. Clinics of N. Amer. 35-677-1951

210- TOBIAN E JR
Cortical steroid excretion in cases of pregnancy, pre-eclampsia
and essential hypertension
J. Clin. Endocrin. and Metab 9-319-1949

211- TURNER HB DELOZIER O HITACHI
Hydration treatment of eclampsia
JAMA 148-979-1952

212- TURNER HB HOUCK LR
Renal hemodynamics in toxemia of pregnancy
Am J. Obst. Gyn 60-126-1950



216- VAN NORDINK-PASTIANSE MA MASTROICH SL
Experimental aschama of the gravid uterus in dogs
Gynecology 127-1-1949

217- VAN NAGENEN O JENKINS RR
Pyeloureteral dilatation of pregnancy after death of testes
experimental study
Am. J. Obst Gyn 56-1146-1948

218- VERNHUIJ M
Adrenal function in pregnancy
Endocrinology 19-203-1946

219- VERNING ER DYRENFURTH I
Aldosterone excretion in pregnancy
J. Clin. Endocrin. and Metab. 16-426-1946

220- VERNING ER ST COLL
Aldosterone excretion in pregnancy
Idem 17-473-1947

221- VERNING ER SIMPSON OA HENDER S
Adrenal-cortical function in humans of pregnancy
Am. J. Obst Gyn 63-143-1944

222- VIAL ER - DELAY E SUPER M
Donnees statistiques du resultat de l'accouchement dans les hyper-
tensions gynecologiques
Gyn Obst 47-593-1948

223- WALLACE I
Specific hypoxemic stresses of pregnancy. Factors affecting
infant mortality.
Am. J. Obst. Gyn 64-271-1952

224- WERKO L BUCHT H
Hemostatic and arterial pressure and renal blood flow in patients
with diffuse systemic glomerulonephritis during pregnancy.
Act. Med. Scand. 153-177-1956

225- ZILLIACUS R
Pathogenie de l'eclampsie
Acta Obst. Gyn Scand 30-1-1950

